

Pharmacode area





## Prosterid

**FI:** Prosterid-valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia joihin kuuluu masentunut mieliala, masennus tai itsetuhoiset ajatukset. Jos koet mielialan muutoksia, lopeta finasteridin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriisi mahdollisimman pian saadaksesi lisäohjeita.

Joillain potilailla seksuaaliset toimintahäiriöt voivat aiheuttaa mielialan muutoksia, mukaan lukien itsemurha-ajatuksia. Jos koet seksuaalisen toimintahäiriön oireita ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisäohjeita.

Versio: 1 2care4 Generics ApS

# FRONT

SEFPC135476A1

## Prosterid

**SE:** Prosterid kan orsaka biverkningar inklusive nedstämdhet, depression eller självmordstankar. Om du upplever humörsvängningar, sluta ta finasterid och kontakta din läkare för medicinsk rådgivning så snart som möjligt.

Hos vissa patienter kan nedsatt sexuell funktion bidra till humörsvängningar, inklusive självmordstankar. Om du upplever symtom på nedsatt sexuell funktion, kontakta din läkare för medicinsk rådgivning.

Version: 1 2care4 Generics ApS

# BACK