

Patientkort

Detta patientkort är till för patienter som behandlas med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab.

För patienter

Bär alltid det här kortet med dig för att informera sjukvårdspersonal om att du behandlas med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab.



Nivolumab kan öka risken för allvarliga eller livshotande biverkningar som kan påverka olika delar av kroppen. Om du upplever några som helst tecken eller symtom, tala **genast** om det för din läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i detta patientkort eller i bipacksedeln för nivolumab.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR



Bröstkorg
(hjärta och
lungor)

Andningssvårigheter, hosta, väsande andning, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärklappning (ökad medvetenhet om dina hjärtslag)



Mage
(magsäck och
tarmar)

Diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk



Lever

Gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida av magtrakten



Njurar

Förändring i mängd urin och/eller frekvens av urinering



Hormonproducerande körtlar (inklusive diabetes)

Huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning (trötthet), viktförändringar, beteendeförändringar (såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska), överdriven törst, ökad aptit med vikt förlust, svaghet, dåsighet, depression, allmän sjukdomskänsla, förändring i mängd urin och/eller frekvens av urinering



Hud

Utslag, klåda, blåsor och/eller hudfällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor



Övrigt

Svaghet, utmattning (trötthet), minskad aptit, illamående, kräkning, stickningar eller domningar i armar och ben, svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, huvudvärk, krampanfall, nackstelhet, förvirring, dåsighet, muskelsmärta, stelhet, mörk urin, smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem

Viktigt

- Berätta för din läkare om dina tidigare medicinska tillstånd, inklusive om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation från en annan person (allogen transplantation).
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att behandlingen med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab tillfälligt eller permanent måste avbrytas.
- Tecken och symtom som kan verka lindriga kan snabbt bli värre om de inte behandlas.
- Försök **inte** behandla dessa symtom själv.
- Tecken och symtom kan uppkomma under behandlingen eller vara fördröjda och uppkomma veckor eller månader efter din sista dos.

För mer information, se OPDIVO bipacksedel (www.fass.se eller www.ema.europa.eu) eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på +46 8 58507304.

Viktig information för sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Konsultation av en onkolog eller övrig specialistläkare kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- För mer information till sjukvårdspersonal, se OPDIVO produktresumé (www.fass.se, www.lakemedelsverket.se/lakemedelsfakta eller www.ema.europa.eu) eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på +46 8 58507304.

Läkare som förskriver nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab till patienten ska fylla i avsnittet "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

Kontaktuppgifter till min läkare (läkare som förskrivit nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab)

Läkarens namn: _____

Telefonnummer: _____

Jourtelefon: _____

Patientens kontaktuppgifter

Patientens namn: _____

Patientens telefonnummer: _____

Kontaktperson vid en nödsituation (namn och telefonnummer): _____