

Följande uppgifter är endast avsedda **för hälso- och sjukvårdspersonal**:

Dosering och administreringssätt

Tidpunkt för administrering i förhållande till cisplatin

Tidpunkten för administrering av natriumtiosulfat i förhållande till cisplatinkemoterapi är av avgörande betydelse.

Om natriumtiosulfat administreras

- mindre än 6 timmar efter avslutad infusion av cisplatin kan detta minska den effekt som cisplatin har på tumören,
- mer än 6 timmar efter avslutad infusion av cisplatin är läkemedlet eventuellt inte effektivt när det gäller att förebygga ototoxicitet.


Natriumtiosulfat får endast användas efter infusioner av cisplatin som varar högst 6 timmar. Använd inte natriumtiosulfat om

- infusionen av cisplatin pågår i mer än 6 timmar, eller
- en efterföljande infusion av cisplatin planeras inom 6 timmar.

Om cisplatin administreras under flera på varandra följande dagar måste man säkerställa att det går minst 6 timmar efter infusionen av natriumtiosulfat innan en efterföljande infusion av cisplatin ges.

Följande gäller efter avslutad infusion av cisplatin:

- Tillhandahåll högeffektiv intravenös antiemetisk kombinationsbehandling 30 minuter före administrering av natriumtiosulfat, dvs. 5,5 timmar efter avslutad infusion av cisplatin (se avsnitt 4.4).
- Detta läkemedel är en infusionsvätska, lösning som är färdig att användas.
- Inspektera visuellt innehållet i flaskan/flaskorna avseende partiklar och missfärgning innan administrering.
- Förbered den dos som behövs av natriumtiosulfat från injektionsflaskan/flaskorna i en spruta eller tillsätt till en tom, steril infusionspåse.
- Stoppa cisplatinhydreringsvätskan och spola slangen med 0,9% natriumklorid.
- Infundera natriumtiosulfat i 15 minuter (6 timmar efter avslutad infusion av cisplatin).
- Spola slangen med 0,9% natriumklorid och återuppta cisplatinhydreringen omedelbart efteråt.



CIS = cisplatin

Se ”*Tidpunkt för administrering i förhållande till cisplatin*” för kritisk information om tidpunkten för administrering av natriumtiosulfat.

Detta läkemedel tillhandahålls som en injektionsflaska för engångsbruk som innehåller 8 g som 80 mg/ml. Den rekommenderade dosen natriumtiosulfat för att förebygga cisplatininducerad ototoxicitet är viktbaserad och omräknad till kroppsytan enligt tabellen nedan:

Rekommenderad dos av natriumtiosulfat vid intravenös infusion

Kroppsvikt	Dos	Volym
> 10 kg	12,8 g/m ²	160 ml/m ²
5 till 10 kg	9,6 g/m ²	120 ml/m ²
< 5 kg	6,4 g/m ²	80 ml/m ²

Anvisningar för användning, hantering och destruktion

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har påvisats i 24 timmar vid kontrollerad rumstemperatur för läkemedel som lagras i IV-påsar av polyvinylklorid, etenvinylacetat och polyolefin.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart efter öppnande. Om det inte används omedelbart är lagringstider vid användning och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt sett inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 °C.