

# Eydenzelt™ (aflibercept)

## Patientguide

Version: 1.0 / April 2026

**Den här guiden har tagits fram för patienter som har ordinerats Eydenzelt (aflibercept, injektionsvätska, lösning).**

Din läkare har skrivit ut Eydenzelt eftersom du har fått diagnos för en av följande ögonsjukdomar:

- Våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)
- Diabetiska makulaödem (DME)
- Makulaödem sekundärt till retinal centralvensockklusion (CRVO)
- Makulaödem sekundärt till retinal grenvensockklusion (BRVO)
- Myopisk koroidal neovaskulisering (myopisk CNV)

Din läkare kommer att använda Eydenzelt 40 mg/ml lösning för den rekommenderade dosen på 2 mg aflibercept.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Se avsnitt Biverkningar i Eydenzelts bipacksedel om hur man rapporterar biverkningar.

**Guiden finns tillgänglig i både tryckt och digitalt format samt som en ljudguide (ljudversion)**

Ljudguiden läser upp texten i den här broschyren.

Digital samt ljudversion av guiden finns tillgänglig på

[www.fass.se](http://www.fass.se), alternativt genom att **scanna QR-kod bredvid:**

**Ljudversion av guiden  
samt nedladdning av  
digital version:**



Mer information om Eydenzelt finns i bipacksedeln som finns tillgänglig på: [www.fass.se](http://www.fass.se) samt via QR-koden ovan.

## Vad är Eydenzelt?

Eydenzelt är en typ av läkemedel som kallas VEGF-hämmare som är en förkortning av "vaskulär endotel tillväxtfaktor" och beskriver hur Eydenzelt verkar för att skydda din syn. Eydenzelt blockerar VEGF och bidrar på så sätt till att minska svullnaden i näthinnan, vilket i sin tur kan förbättra synen och förhindra att den blir sämre.

Eydenzelt är en lösning (vätska) som injiceras i ögat. Det finns som 2 mg-dos. Läkaren avgör vilken dos som är bäst för att tillgodose just dina behov. Läkaren rekommenderar också ett behandlingsschema för dig och det är mycket viktigt att du följer det.

**Till skillnad från den ursprungliga produkten Eylea är Eydenzelt inte indicerat för behandling av barn.**

### Vad behöver läkaren veta innan du behandlas med Eydenzelt?

Innan du börjar med Eydenzelt-behandlingen ska du tala om för din läkare eller sköterska om du:

- Har en infektion i eller runt ögat.
- För närvarande upplever smärta eller rodnad i ögat.
- Tror att du kan vara allergisk mot jod, mot något smärtlindrande läkemedel eller mot något av innehållsämnen i Eydenzelt.
- Tidigare har haft problem med injektioner i ögonen.
- Har glaukom eller tidigare haft ökat tryck i ögat.
- Ser eller tidigare har sett ljusblixtar eller fläckar i synfältet.
- Tar receptbelagda eller receptfria mediciner.
- Har genomgått eller ska genomgå en ögonoperation inom 4 veckor före eller efter behandlingen med Eydenzelt.
- Är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Det finns mycket begränsad information om säkerheten vid användning av Eydenzelt till gravida kvinnor.

Eydenzelt 2 mg ska inte användas under graviditet om inte nyttan överväger risken för fostret. Diskutera med din läkare innan du påbörjar behandling med Eydenzelt. Kvinnor i barnafödande ålder ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen. Om du behandlas med Eydenzelt 2 mg ska du fortsätta att använda ett effektivt preventivmedel i minst tre månader efter den sista injektionen. Små mängder av Eydenzelt kan passera över i bröstmjolk. Effekterna av Eydenzelt på ammade nyfödda barn/spädbarn är okänd. Användning av Eydenzelt rekommenderas inte under amning.

## Hur kan jag förbereda mig inför mitt läkarbesök för Eydenzelt?

Det kan hända att din läkare ber dig ta ögondroppar några dagar före besöket. Efter besöket är det möjligt att du ser suddigt, så du bör inte köra bil hem. Be en vän eller någon i familjen köra dig till besöket eller ordna på annat sätt så att du kan komma dit och hem igen. Använd inte smink under själva behandlingsdagen.

## Vad kan jag förvänta mig efter behandlingen med Eydenzelt?

Det är möjligt att din läkare gör några ögontester efter injektionen. Det kan vara t.ex. att mäta trycket inne i ögat. Efter injektionen kan du uppleva tillfälliga synstörningar, och du bör inte köra bil förrän du ser normalt igen.

Under några dagar framöver kan ögat bli blodsprängt, eller så kan du se flytande/svävande fläckar. Båda dessa symtom bör gå över på några dagar. Om de inte gör de, eller om de blir värre, ska du kontakta din läkare.

En del patienter kan känna viss smärta eller ett visst obehag i ögat efter injektionen. Om det inte går över eller blir värre ska du kontakta din läkare.

## Har Eydenzelt biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Eydenzelt orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart din läkare om du får några av de symtom som anges i tabellen nedan eftersom de kan vara tecken på en allvarlig komplikation till behandlingen:

Tillstånd	Några möjliga tecken eller symtom
<b>Infektion eller inflammation inuti ögat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ögonsmärta eller ökat obehag</li> <li>• Förvärrad ögonrodnad</li> <li>• Ljuskänslighet</li> <li>• Svullet ögonlock</li> <li>• Synförändringar såsom plötsligt försämrad syn eller dimsyn</li> </ul>
<b>Grumling av linsen (grå starr)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimsyn</li> <li>• Skuggseende</li> <li>• Svaga konturer och oskarpa former</li> <li>• Sämre färgseende (t.ex. färger ser "urtvättade" ut)</li> </ul>
<b>Ökat tryck i ögat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glorior runt ljus</li> <li>• Ögonsmärta</li> <li>• Röda ögon</li> <li>• Illamående eller kräkningar</li> <li>• Synförändringar</li> </ul>
<b>Bristning eller avlossning av ett av skikten i näthinnan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plötsliga ljusblixtar</li> <li>• Plötslig uppkomst eller ökning av antalet synfläckar</li> <li>• En gardinliknande skugga som skymmer delar av synfältet</li> <li>• Synförändringar</li> </ul>

En fullständig förteckning över biverkningar finns i bipacksedeln för Eydenzelt som medföljer i förpackningen. Bipacksedeln finns även tillgänglig på [www.fass.se](http://www.fass.se) och via den QR-kod som anges i början av denna guide.

**Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.**

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se), eller genom att kontakta företaget via e-post: [drugsafety\\_se@celltrionhc.com](mailto:drugsafety_se@celltrionhc.com).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## Vad gör jag om jag har frågor eller känner mig orolig?

Om du har frågor eller känner dig orolig ska du i första hand vända dig till din läkare eller sjuksköterska. De är mycket erfarna och känner till din individuella situation och kan därför ge dig de svar du behöver.

Din Ögonklinik är:.....

.....

Kontakt:.....

Telefon:.....

Adress:.....

E-post:.....

---

Celltrion Sweden AB  
www.celltrion.se  
contact\_se@celltrionhc.com