

▼ IMDYLLTRA® (tarlatamab) PATIENTKORT

SKA IFYLLAS AV DEN BEHANDLANDE LÄKAREN

DENNA PATIENT HAR BEHANDLATS MED IMDYLLTRA

Patientens namn / telefonnummer

Datum och tid för första IMDYLLTRA-infusionen

Behandlande läkares namn / telefonnummer

Namn på sjukhus / vårdenhet

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se.

[Detta patientkort uppfyller villkoren för försäljningsgodkännandet.]

JUNI 2026 SE - Version 1.0

VIKTIG INFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

- Denna patient behandlas med IMDYLLTRA, som är en bispecifik T-cell engager (BiTE) molekyel.
- IMDYLLTRA används för behandling av vuxna patienter med småcellig lungcancer (SCLC).
- IMDYLLTRA kan orsaka biverkningar som kan vara allvarliga och livshotande, såsom cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).

Mer information om behandling av CRS och ICANS finns tillgängligt i produktresumén som finns att tillgå på Läkemedelsfakta och kan nås via lakemedelsverket.se.

Om denna patient upplever några av symtomen på detta kort, vänligen kontakta den behandlande läkaren omedelbart för mer information.

VIKTIG INFORMATION TILL PATIENTER/NÄRSTÅENDE

IMDYLLTRA kan orsaka allvarliga och/eller livshotande biverkningar, såsom cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).

Kontakta din behandlande läkare eller sök akut medicinsk hjälp OMEDELBART om du upplever NÅGOT av dessa symptom.

- Feber (38.0°C eller högre)
- Svår huvudvärk
- Hypotoni (lågt blodtryck)
- Frossa, kraftig frossa
- Andningssvårigheter
- Svårt illamående, kräkningar eller diarré
- Snabb eller oregelbunden hjärtrytm
- Krampanfall
- Förvirringstillstånd, talsvårigheter, minnes- och personlighetsförändring
- Försämrad balans, svaghet, domningar
- Yrsel eller svimningskänsla
- Extrem sömnhet eller nedsatt medvetenhet

Detta är inte alla möjliga biverkningar av IMDYLLTRA. Vänligen se bipacksedeln på FASS.se för en fullständig lista över möjliga biverkningar. Du bör alltid rådgöra med din behandlande läkare om att ta andra mediciner samtidigt som du får IMDYLLTRA.

VIKTIG INFORMATION TILL PATIENTER/NÄRSTÅENDE

Du måste hålla dig nära en lämplig vårdinrättning, såsom behandlings-sjukhuset, i 24 timmar från starten av varje IMDYLLTRA-infusion på dag 1 och på dag 8, tillsammans med en närstående.

KONTAKTA din behandlande läkare om du upplever något av symtomen som anges på detta kort.

SÖK akut hjälp om du inte kan nå din behandlande läkares mottagning.

KÖR INTE bil eller använd maskiner om du får neurologiska symtom, såsom yrsel, anfall och förvirring, tills symtomen har försvunnit.