

Patientens namn:

Läkarens namn och kontaktuppgifter:

Du kan även rapportera din graviditet till Merck på: drug.safety.nordic@merckgroup.com

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apoteks-personal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedelssäkerhet.

PATIENTKORT

Graviditetsförebyggande åtgärder om du tar Ogsiveo ▼ (nirogacestat)

Ogsiveo kan orsaka fosterskador och även missfall om det tas under en graviditet.

Ta inte Ogsiveo om du är gravid. Om du är i fertil ålder och kan bli gravid kommer läkaren att kontrollera om du är gravid innan du påbörjar behandlingen med Ogsiveo. Du kommer även att behöva utföra graviditets-tester under behandlingen om du slutar få menstruation eller vid onormala menstruationsblödningar.



Om du är kvinna i fertil ålder och du kan bli gravid eller en man vars partner kan bli gravid måste du använda minst en mycket effektiv preventivmetod (exempelvis en spiral) eller två kompletterande typer av preventivmedel inklusive en barriärmetod (exempelvis kondom i kombination med spermiedödande medel) under behandlingen med Ogsiveo och i 1 vecka efter den sista dosen.

Tala med läkare om vilket preventivmedel som kan passa dig.

Om du misstänker att du är gravid ska du genast tala om detta för läkare eller sjuksköterska. Om du är gravid måste du sluta ta Ogsiveo.

Du ska alltid ha med dig detta kort.

June 2026 v1.0. SE-OGS-00002

