

Viktig information till hälso- och sjukvårdspersonal

Den här patienten behandlas med ZYNYZ® (retifanlimab), vilket kan orsaka immunrelaterade biverkningar när som helst under behandlingen, eller till och med efter avslutad behandling. Bedöm patienten med avseende på tecken och symptom på immunrelaterade biverkningar. Tidig diagnos och rätt handläggning är mycket viktigt för att minimera följderna av immunrelaterade biverkningar.

Särskilda riktlinjer för handläggning av immunrelaterade biverkningar finns i produktresumén för retifanlimab.

Rådgör gärna med onkolog eller annan specialist vid handläggning av organspecifika immunrelaterade biverkningar.

© 2025 Incyte Corporation. Med ensamrätt.
Utbildningsmaterial, version 1.0/Februari 2026
SE/ZYN/NP/26/0001.

Mer information hittar du i bipacksedeln till ZYNYZ eller på följande webbplats:
www.incyteglobalmedicalinformation.com
Du kan även ringa informationslinjen Incyte Medical Information på +800 00027423
avgiftsfritt eller skicka e-post till
eumedinfo@incyte.com

VIKTIGT

- Försök inte att behandla biverkningar själv.
- Avbryt inte behandlingen med ZYNYZ såvida du inte har diskuterat detta med din läkare.
- Ha alltid det här kortet med dig, särskilt om du reser bort, uppsöker en akutmottagning eller när du behöver träffa någon annan läkare eller sjukvårdspersonal.
- Fortsätt att ha kortet med dig i minst 4 månader efter din sista dos av retifanlimab.
- Om du upplever biverkningar ska du genast kontakta din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns på det här kortet.
- Milda symtom kan snabbt utvecklas till svåra om inte tidig behandling påbörjas.
- Genom att rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket på www.lakemedelsverket.se kan du bidra till att öka kunskapen om det här läkemedlets säkerhet.

Patientkort

ZYNYZ® (retifanlimab)

Viktig säkerhetsinformation i syfte att minimera risken för immunrelaterade biverkningar

Zynyz kan orsaka allvarliga biverkningar som ibland kan bli livshotande och leda till dödsfall. Biverkningarna kan uppstå när som helst under behandlingen, eller till och med när behandlingen har avslutats. Du kan uppleva mer än en biverkning samtidigt.

Kontakta specialistläkaren omedelbart om du drabbas av symptom eller tecken på biverkningar, även sådana som inte nämns på det här kortet. Din läkare kan ge dig andra läkemedel i syfte att förebygga allvarligare komplikationer och lindra dina symptom. Din läkare kan låta bli att ge dig nästa dos av ZYNYZ eller avbryta behandlingen.

▼ Detta läkemedel är föremål för ökad övervakning.

**Tala omedelbart om för läkare
om du får något av följande symptom:**

Lungor

- Andningssvårigheter
- Ny eller förvärrad hosta
- Bröstmärta

Mag-tarmkanal

- Frekvent diarré som ofta innehåller blod och/eller slem
- Fler tarmtömningar än vanligt
- Blodig, svart eller tjärliknande avföring
- Svår smärta eller ömhet i magen
- Illamående eller kräkningar

Lever

- Aptitlöshet
- Ihållande illamående eller kräkningar
- Smärta på höger sida av magen
- Gulnade ögon och/eller hud
- Dåsighet
- Mörkt färgad urin
- Får lättare blåmärken eller blöder mer än vanligt

Njurar

- Minskad urinvolym
- Skummande urin
- Blod eller spår av blod i urinen som eventuellt ändrar färg
- Svullna fotleder
- Aptitlöshet

Hormonkörtlar

- Snabb hjärtrytm
- Yrsel eller svimningskänsla

- Kraftig trötthet
- Ihållande eller ovanlig huvudvärk
- Viktförändring
- Frusenhet
- Håravfall
- Förstoppning

Diabetes typ 1 eller ketoacidosis vid diabetes

- Mer hungrig eller törstig än vanligt
- Måste kissa ofta
- Viktnedgång
- Trötthets- eller sjukdomskänsla
- Svårt att tänka klart
- Snabb och djup andning
- Sötaktig eller fruktdoftande utandningsluft
- Sötaktig eller metallisk smak i munnen
- Magsmärta
- Sömnighet
- Urin eller svett luktar annorlunda

Hud

- Utslag eller klåda
- Blåsor eller sår i munnen, näslemhinnan, halsen eller kring könsorganen

Hjärta

- Skarp bröstsmärta

Ögon

- Synförändringar

Bukspottskörtel

- Buksmärta
- Illamående eller kräkningar

Muskler

- Smärta
- Stelhet

Nervsystemet

- Domningar eller svaghet

Infusionsrelaterade reaktioner:

- Frossa, darrningar eller feber
- Klåda eller utslag
- Rodnande eller svullet ansikte
- Andfäddhet eller väsande/pipande andning
- Yrsel eller illamående

Viktiga kontaktuppgifter

Specialistläkarens namn

Telefonnummer under kontorstid

Telefonnummer efter kontorstid

Mitt namn

Mitt telefonnummer

Nödkontakt (namn)

Nödkontakt (telefonnummer)