



Patientens namn: _____

Datum då CERDELGA®
först förskrevs: _____

Status CYP2D6-
metabolisering: _____

Behandlande
klirik: _____

Behandlande
läkare: _____

Kontaktuppgift till
behandlande klinik: _____



PATIENTKORT

Information till patienten

Bär alltid med dig detta kort och visa det för all hälso- och sjukvårdspersonal för att informera om din aktuella behandling med CERDELGA®.

- Börja inte använda något nytt receptbelagt läkemedel, receptfritt läkemedel eller växtbaserade läkemedel eller hälsokostpreparat utan att tala om det för läkare eller apotekspersonal.
- Undvik intag av produkter som innehåller grapefrukt.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

CERDELGA® är indicerat för långtidsbehandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 som är långsamma (poor metabolisers, PM), intermediära (intermediate metabolisers, IM) eller snabba (extensive metabolisers, EM) CYP2D6-metaboliserare. CERDELGA® är även indicerat för barn 6–17 år med Gauchers sjukdom typ 1, som väger minst 15 kg, som är stabila med enzymsättningsterapi (ERT), och som är långsamma, intermediära eller snabba CYP2D6-metaboliserare.

För ytterligare information, se produktresumén.

Snabba och Intermediära CYP2D6-metaboliserare:

- CERDELGA® får inte användas i kombination med en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare vid samtidig behandling med en stark eller måttlig CYP3A-hämmare
- CERDELGA® får inte användas hos snabba metaboliserare
 - med allvarligt nedsatt leverfunktion
 - med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion, som samtidigt behandlas med en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare
- CERDELGA® rekommenderas inte
 - till snabba CYP2D6-metaboliserare med måttligt nedsatt leverfunktion
 - till intermediära CYP2D6-metaboliserare med någon grad av nedsatt leverfunktion
- CERDELGA® rekommenderas inte för användning i kombination med:
 - en stark CYP3A-inducerare
- CERDELGA® ska användas med försiktighet i kombination med:
 - en måttlig CYP2D6-hämmare
 - en stark eller måttlig CYP3A-hämmare
 - ett P-gp- eller CYP2D6-substrat (dosminskning av dessa läkemedel kan krävas)

- CERDELGA® rekommenderas inte till snabba eller intermediära CYP2D6-metaboliserare med terminal njursvikt (ESRD), eller till intermediära CYP2D6-metaboliserare med lätt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion.
- CERDELGA®-dosen ska minskas till en dos EN GÅNG dagligen hos:
 - intermediära metaboliserare och snabba metaboliserare vid samtidig användning av en stark CYP2D6-hämmare
 - snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion som tar en svag CYP2D6-hämmare eller en stark, måttlig eller svag CYP3A-hämmare

Långsamma CYP2D6-metaboliserare:

- CERDELGA® får inte användas i kombination med en stark CYP3A-hämmare
- CERDELGA® rekommenderas inte till långsamma metaboliserare med någon grad av nedsatt leverfunktion
- CERDELGA® rekommenderas inte för användning i kombination med:
 - en stark CYP3A-inducerare
 - en måttlig CYP3A-hämmare
- CERDELGA® rekommenderas inte till långsamma metaboliserare med terminal njursvikt eller med lätt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion
- CERDELGA® ska användas med försiktighet i kombination med:
 - en svag CYP3A-hämmare
 - ett P-gp- eller CYP2D6-substrat (dosminskning av dessa läkemedel kan krävas)