

Administrering av midazolam nässpray

Instruktionskort för föräldrar och vårdnadshavare

Version 01/Januari-2026

- 1 Ta ut nässprayen från blisterförpackningen.
- 2 Håll nässprayen genom att placera tummen på spraybehållarens kolv och pek- och långfingret på båda sidorna av näspipen.



Testa inte nässprayen, den kan bara användas en gång.


- 3 För in näspipen i ena näsborren tills pek- och långfingret nuddar näsan.



Nässprayen kan ges i alla positioner, både till patienter som ligger ner eller sitter upp.

Hos små barn kanske näspipen inte kan föras in i näsborren:

Placera i så fall näspipens ände mot näsborrens öppning, en bit av näspipen kommer in i näsborren eftersom toppen har en sfärisk form. Se till att näspipen tätar näsborren innan du ger sprayen.



- 4 Tryck hårt på kolven med tummen.
- 5 Ta bort näspipen från näsan. Spraybehållaren är nu tom. För ytterligare information om användningen vänligen se bipacksedeln.



Viktigt:

På andra sidan finns instruktioner för hur du kontrollerar patientens andning efter att midazolam nässpray har givits.



6 Vid behandling av ett epileptiskt anfall ska patienten, om möjligt, placeras i stabilt sidoläge – du kan behöva vänta tills kramperna har upphört.

När patienten har placerats i sidoläge ska munnen vara vidöppen, riktad mot marken och huvudet lutat bakåt.

Så här placeras patienten i sidoläge:

A. Placera den närmaste armen i rät vinkel mot kroppen, med armen böjd.



B. För andra armen över bröstet. Placera patientens handrygg mot kinden.



C. Ta tag i det borte benet precis ovanför knäet. Rulla patienten mot dig, till sidoläge. Stöd huvudet genom att hålla handryggen mot kinden.



D. Öppna munnen (om möjligt) och rikta den mot marken, luta huvudet något bakåt. Slutlig position; handen stödjer huvudet.



7 Kontrollera andningen

1. Spreta med fingrarna på båda händerna.
2. Placera ena handen vid övergången mellan mage och bröst och den andra handen mitt på ryggen. Se till att fingrarna pekar mot patientens huvud.
3. Håll ditt öra så nära patientens huvud som möjligt och titta mot bröstkorgen/magen. Titta, känn och lyssna i högst 10 sekunder efter normal andning (magen eller bröstkorgen ska höjas 2–3 gånger och du ska inte höra några ljud som rosslingar, gurgel eller snarkningar).
4. Upprepa ovanstående minst 2 gånger per minut.

8 Är andningen inte normal?

Om anfallet inte upphör inom 10 minuter efter given dos -

Ring 112

och följ deras instruktioner noga.

9 Ge en andra dos enbart om du blivit instruerad att göra det

Använd då en ny endosbehållare och följ instruktionerna i steg 1-5 igen.

Ge den andra dosen i den andra näsborren, dvs. inte den som användes för den första dosen.