Apixaban Medical Valley (apixaban) Patientkort

Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren.

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal före behandling.

Jag behandlas med Apixaban Medical Valley (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar.

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn:

Födelsedatum:

Indikation:

Vikt:

Dos: mg två gånger dagligen

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Information till patienter/vårdnadshavare

- Ta/ge Apixaban Medical Valley regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas/ges tillsammans med kvällsdosen. En missad kvällsdos kan bara tas/ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa ditt doseringsschema två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta/ge Apixaban Medical Valley utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke, blodpropp eller andra komplikationer.
- Apixaban Medical Valley hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart.**
- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder Apixaban Medical Valley.

Information till vårdpersonal

- Apixaban Medical Valley (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Medical Valley kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Medical Valley kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.ex. vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av apixabans anti-faktor Xa-aktivitet finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatriska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).

version 1.0/Mars 2026
2026-03-10

932967-01