Risk för cancer

RINVOQ kan potentiellt öka risken att utveckla cancer, särskilt hudcancer.

Informera din läkare om du uppmärksammar någon förändring i utseendet av huden eller upptäcker en ny tillväxt på huden.

Risk för hål i tarmen

RINVOQ kan öka risken för hål i tarmen, särskilt om du har Crohns sjukdom. Berätta för din läkare omedelbart om du upplever oförklarlig eller oväntad smärta i magen (buken).

Visa detta kort för hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård och behandling – till exempel din tandläkare eller en akutvårdsläkare.

Rapportera biverkningar till: www.lakemedelsverket.se

Ditt namn:

Läkarens namn – som ordinerat RINVOQ:

Läkarens telefonnummer:

Datumet du påbörjade behandlingen:

SE-UPAD-190021 v6.0 juni 2026
Version 6.0. May 2026.
www.rinvoq.eu www.fass.se

abbvie

Patientkort
Du (eller din vårdgivare) ska alltid ha med sig detta kort

Säkerhetsinformation om RINVOQ® (upadacitinib) för patienter

- Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandling med RINVOQ.
- Läs bipacksedeln för mer information.

Risk för infektion

RINVOQ kan göra en pågående infektion värre eller öka risken för att du får en ny infektion, till exempel tuberkulos (TB), bältros eller hepatitinfektion.

Informera omedelbart din läkare om du får tecken på en infektion, till exempel:

- Feber, svettningar, frossa, viktnedgång eller hosta som inte går över – detta kan vara tecken på TB.
- Smärtsamt hudutslag med blåsor – detta kan vara tecken på bältros.
- Trötthetskänsla eller andfåddhet – detta kan vara tecken på lunginflammation.

Tala om för din läkare om:

- du nyligen har diagnostiserats med TB eller någonsin har haft TB.
- du nyligen har varit i nära kontakt med någon som har TB.

Vacciner - används för att förhindra infektioner

Levande vacciner (t.ex. influensavaccin som nässpray, vattkoppor, mässling, påssjuka, röda hund, tuberkulos (BCG)) ska inte ges under behandling med RINVOQ eller omedelbart före behandling med RINVOQ.

Tala med din läkare innan du får några vacciner – de vet vilka vacciner du inte ska ta innan eller under behandling med RINVOQ.

Risk för hjärtsjukdom

RINVOQ kan potentiellt öka risken för hjärtsjukdom.

Informera din läkare omedelbart om du får några symtom såsom smärta och tryckkänsla i bröstet eftersom detta kan vara tecken på hjärtsjukdom.

Risk för blodproppar i vener eller lungor

Blodproppar i vener och lungor har observerats med RINVOQ. Sök läkare omedelbart om du får tecken på blodproppar i vener eller lungor, såsom plötslig andfåddhet, en smärtsam svullnad i ben eller bröstsmärta.

Preventivmedel, graviditet och amning

RINVOQ ska inte användas om du är gravid.

- Använd ett effektivt preventivmedel medan du tar RINVOQ och i 4 veckor efter den sista dosen. Tala med din läkare om effektiva preventivmedel.
- Informera din läkare omedelbart om du vill bli eller blir gravid.
- Informera så snart som möjligt läkaren om ditt barn får sin första menstruation (mensblödning) medan hon tar RINVOQ.
- Amma inte när du tar RINVOQ.