

PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT ABSENER[®] ELLER ABSENER DEPOT

Du har fått **Absener** enterotablett, oral lösning eller orala droppar alternativt **Absener depottabletter** förskrivet av din läkare. Du kan tidigare ha fått ett annat läkemedel med samma verksamma ämne (natriumvalproat). Absener och Absener Depot uppfyller samma krav på effekt och säkerhet som andra läkemedel med det verksamma ämnet natriumvalproat. Absener och Absener Depot är läkemedel som används för att behandla epilepsi och maniska episoder vid bipolär sjukdom hos patienter som inte kan ta litium. Din läkare kan ha ordinerat Absener och Absener Depot för behandling av andra sjukdomar. **Följ alltid din läkares instruktioner.**

Bipolär sjukdom

Absener används vid behandling av bipolär sjukdom och de maniska episoder som förekommer. Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Absener används som underhållsbehandling eller förebyggande behandling av manodepressiv sjukdom (bipolär sjukdom) hos patienter som inte förbättras med eller inte tål litium.

Epilepsi

Absener och Absener Depot används för behandling av olika former av epilepsi (bl.a. partiell och generaliserade anfall såsom tonisk-kloniska anfall och absenser). Absener och Absener Depot ges som tillägg till annan epilepsibehandling eller som enda behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Är du kvinna som kan få barn ska du inte ta Absener eller Absener Depot, om du inte använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Absener. Sluta inte ta Absener eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din läkare.



Om du är eller misstänker att du är gravid, planerar att skaffa barn, om du ammar eller planerar att amma, kontakta omedelbart läkare innan du fortsätter använda detta läkemedel. Om du behandlas för epilepsi ska du inte avsluta din behandling utan att diskutera det med din läkare. Detta är extra viktigt om du har epilepsi. Hormonella preventivmedel (som till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Absener och Absener Depot fungerar. Berätta för din läkare om du tar p-piller. Absener kan medföra en allvarlig risk för fosterskador.

Läs bipacksedeln

Ta alltid Absener och Absener Depot enligt din läkares anvisningar. Det är viktigt att du läser bipacksedeln noga. Kontakta din behandlande läkare om du har ytterligare frågor kring din behandling. Absener och Absener Depot kan försämra reaktionsförmågan. Du ska inte köra bil, använda verktyg eller maskiner om du inte känner dig bra. Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra bil och använda maskiner.

Mer information finns på fass.se

PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT ABSENor[®] ELLER ABSENor DEPOT

MIN ORDINATION							
	Styrka	Morgon	Lunch	Middag	Kväll	Dygnsdos (antal tabletter)	Dygnsdos (mg)
Absenor [®] Enterotablett	100 mg						
Absenor [®] Enterotablett	300 mg						
Absenor [®] Enterotablett	500 mg						
Absenor [®] Depottablett	300 mg						
Absenor [®] Depottablett	500 mg						
	Styrka	Morgon	Lunch	Middag	Kväll	Dygnsdos (antal ml)	Dygnsdos (mg)
Absenor [®] Oral lösning*	60 mg/ml						
Absenor [®] Orala droppar*	200 mg/ml						

* Apoteket lämnar kostnadsfritt ut en lämplig doseringsspruta (1 ml och/eller 10 ml spruta) för korrekt dosering av flytande Absenor[®] lösning/droppar.

ANTECKNINGAR/KOM IHÅG



Absenor kan medföra
en allvarlig risk för
fosterskador.



Läs alltid bipacksedeln innan du startar din behandling.
Skanna QR-koden för att läsa bipacksedeln på fass.se.



www.orionpharma.se