


Bruksanvisning

OmvoH 100 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

mirikizumab

2 förfyllda sprutor



Läs detta innan du injicerar Omvoh. Följ alla steg för steg-instruktioner.


- **2 injektioner av Omvoh krävs för en full dos.**
- Injicera 1 förfylld spruta med Omvoh och fortsätt omedelbart med den andra förfyllda Omvoh-sprutan.

Tänk också på följande:

- Läkaren eller sjuksköterskan ska visa dig hur du förbereder och injicerar Omvoh med den förfyllda sprutan. Injicera **inte** dig själv eller någon annan förrän du har blivit visad hur man injicerar Omvoh.
- Den förfyllda sprutan med Omvoh är endast för engångsbruk. Låt inte någon annan använda din spruta och återanvänd den inte. Du kan sprida eller få infektioner.
- Läkaren eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos. Du kan också läsa avsnittet "Välj injektionsställe" i denna bruksanvisning för att få hjälp att välja vilket område som fungerar bäst för dig.
- Om du har problem med synen ska du inte använda den förfyllda Omvoh-sprutan utan hjälp från en vårdare.
- Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.

Innan du använder den förfyllda sprutan med Omvoh ska du noga läsa igenom och följa alla steg för steg-anvisningar.

Delarna i en förfylld Omvoh-spruta



$100 \text{ mg/ml} + 100 \text{ mg/ml} = 1 \text{ full dos}$

VIKTIGT:

- 2 injektioner krävs för full dos.
- Injicera 1 spruta och fortsätt direkt med den andra sprutan.

Förbereda injektionen med Omvoh

Ta ut sprutorna ur kylskåpet

Ta ut 2 sprutor ur kylskåpet.

Låt nålskyddet sitta kvar tills du är redo att ge injektionen.

Låt sprutorna ligga framme i rumstemperatur i 30 minuter före injektionen.

Sprutan får **inte** värmas i mikrovågsugn, sköljas i varmvatten eller placeras i direkt solljus.

Använd **inte** sprutorna om läkemedlet har varit fryst.

Skaka **inte** sprutorna.

Samla ihop tillbehör

Tillbehör:

- 2 sprittorkar
- 2 bomullstussar eller kompresser
- 1 behållare för stickande och skärande avfall (se ”Kassering av Omvoh-sprutan”)

Inspektera sprutorna och läkemedlet

Kontrollera att du har rätt läkemedel. Läkemedlet i sprutan ska vara genomskinligt. Det kan vara färglöst eller svagt gult.



Använd **inte** sprutan, utan kasta den enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar om


- den ser ut att vara skadad
- läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar
- utgångsdatum som står på etiketten har passerat
- läkemedlet är fryst.

Förbered injektionen

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du injicerar Omvoh.

Välj injektionsställe

Läkaren eller sjuksköterskan kan hjälpa dig välja det injektionsställe som passar dig bäst.




- **Du eller någon annan** kan injicera läkemedlet i magområdet (buken). Injicera **inte** närmare naveln än 5 centimeter.
- **Du eller någon annan** kan injicera läkemedlet på lårens framsida. Området ska vara minst 5 centimeter ovanför knät och 5 centimeter under ljumsken.
- **Någon annan** kan injicera läkemedlet i baksidan av din överarm.
- Injicera **inte** på precis samma ställe varje gång. Om du till exempel gav den första injektionen i buken kan den andra injektionen – för att ge hela dosen – ges på ett annat ställe i buken.
- Injicera **inte** i områden där huden är öm, skadad, röd eller hård.

Rengör injektionsstället med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

Injicera Omvoh


1 Ta av nålskyddet från sprutan.

- Låt nålskyddet sitta kvar tills du är redo att ge injektionen.
- Ta av nålskyddet och kasta det i hushållssoporna.
- Sätt **inte** tillbaka nålskyddet. Du kan skada nålen eller sticka dig av misstag.
- Rör **inte** nålen.




2 För in nålen

- Nyp försiktig ihop huden på det ställe där du ska injicera.
- För in nålen i 45 graders vinkel.



3 Injicera

- Tryck sakta på tumgreppet så att kolven trycks in helt och allt läkemedel injiceras.
- Den grå sprutkolven ska vara intryckt hela vägen i sprutan.
- När injektionen är klar ska du se den blå kolvstången genom sprutcyllindern så som bilden visar.
- Dra ut nålen ur huden och släpp försiktigt taget om huden.
- Om du blöder på injektionsstället trycker du en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället.
- Gnugga **inte** på injektionsstället.
- Sätt **inte** tillbaka nålskyddet på den förfyllda sprutan.



Blå kolvstång

Grå sprutkolv

2 injektioner krävs för full dos. Injicera en spruta och fortsätt direkt med den andra sprutan.

Kassera Omvoh-sprutan

Kasta den använda sprutan

- Lägg den använda sprutan i en behållare för stickande och skärande avfall omedelbart efter användning. Kasta inte sprutan i hushållssoporna.



- Om du inte har en behållare för stickande och skärande avfall kan du använda en behållare som:
 - är tillverkad av kraftig plast
 - kan stängas med tättslutande, punktionssäkert lock, utan att stickande/skärande föremål kan komma ut
 - står upprätt och stadigt under användning
 - är läckagesäker
 - är korrekt märkt med en varning om farligt avfall i behållaren.
- När behållaren för stickande och skärande avfall är nästan full ska du följa lokala riktlinjer för hur en behållare för stickande och skärande avfall ska kasseras. Det kan finnas lokala föreskrifter om hur du ska kasta nålar och sprutor.
- Behållaren för stickande och skärande föremål ska inte återvinnas.
- För mer information om hur du kasserar behållaren på rätt sätt, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om tillgängliga alternativ i ditt område.

Vanliga frågor

F. Vad händer om jag låter sprutan värmas i mer än 30 minuter före injektionen?

S. Sprutan kan förvaras i rumstemperatur upp till 30 °C i upp till 2 veckor.

F. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i sprutan?

S. Det är normalt att det finns luftbubblor i sprutan. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

F. Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort nålskyddet?

S. En vätskedroppe på nålspetsen har ingen betydelse. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

F. Vad ska jag göra om det inte går att trycka in kolven?

S. Om kolven har fastnat eller är skadad:

- Fortsätt **inte** använda sprutan.
- Dra ut nålen ur huden.
- Använd inte sprutan. Tala med läkare eller apotekspersonal för att få en ny.

F. Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?

S. Detta är normalt. Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnugga **inte** på injektionsstället.

F. Hur vet jag om injektionen är klar?

S. Injektionen är klar när:

- Den blå kolvstången syns i sprutcyllindern.
- Den grå sprutkolven ska vara intryckt hela vägen in till nålen i sprutan.

Läs hela bipacksedeln till Omvoh som finns i ytterkartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

Ändrades senast 26 maj 2023