

Absenor® orala droppar 200 mg/ml

Absenor® oral lösning 60 mg/ml

Doseringshjälpmedel för doseringssprutor 1 ml och 10 ml

Till Absenor® oral lösning och orala droppar ska en doseringsanordning användas, exempelvis en spruta som möjliggör tillräcklig noggrannhet för korrekt dosering.

Den speciellt framtagna doseringssprutan med tillhörande skruvkork säkerställer att:

- Doseringen alltid blir korrekt
- Det inte läcker ut läkemedel mellan flaska, kork och doseringsspruta

Doseringsprutor i 1 ml och/eller 10 ml ska ordineras på receptet tillsammans med Absenor® oral lösning och/eller droppar. Vilken doseringsspruta (1 ml och/eller 10 ml) som ska tillhandahållas beror på den ordinerade dosen i milliliter. Som hjälpmedel för val av lämplig doseringsspruta, se doseringstabellen nedan. Doseringssprutorna ska tillhandahållas kostnadsfritt till kund från apotek vid receptexpediering. Sprutorna med adapter är speciellt framtagna för att passa Absenor®-flaskorna och säkerställer en korrekt dosering samt minskat spill vid administration.

Av hygieniska skäl rekommenderas byte till ny doseringsspruta när en ny flaska öppnas. Sprutorna beställs av apotek kostnadsfritt med nedanstående varunummer från Tamro.



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Varunummer	Produktnamn	Förpackning	Pris
204679	Absenor®	Doseringspruta 1 ml	Kostnadsfri
204678	Absenor®	Doseringspruta 10 ml	Kostnadsfri

Doseringstabell för Absenor® oral lösning 60 mg/ml (dygnsdos 20-40 mg/kg kroppsvikt¹⁾)

Pediatriisk population

Till barn utan annan antiepileptisk behandling ges initialt 20–40 mg/kg kroppsvikt delat på 2–3 doser i samband med måltid. Dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.²

Absenor oral lösning 60 mg/ml (≤ 1,5 ml är markerade i grön, vänligen använd 1 ml doseringsspruta.)

Dygnsdosering 20 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygnsdos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	60	1,0	0,5	0,3	1 ml	
4 kg	80	1,3	0,7	0,4	1 ml	
5 kg	100	1,7	0,8	0,6	1 ml	
6 kg	120	2,0	1,0	0,7	1 ml	
7 kg	140	2,3	1,2	0,8	1 ml	10 ml
8 kg	160	2,7	1,3	0,9	1 ml	10 ml
9 kg	180	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml
10 kg	200	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml
11 kg	220	3,7	1,8	1,2	1 ml	10 ml
12 kg	240	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
13 kg	260	4,3	2,2	1,4	1 ml	10 ml
14 kg	280	4,7	2,3	1,6		10 ml
15 kg	300	5,0	2,5	1,7		10 ml
16 kg	320	5,3	2,7	1,8		10 ml
17 kg	340	5,7	2,8	1,9		10 ml
18 kg	360	6,0	3,0	2,0		10 ml
19 kg	380	6,3	3,2	2,1		10 ml
20 kg	400	6,7	3,3	2,2		10 ml
21 kg	420	7,0	3,5	2,3		10 ml
22 kg	440	7,3	3,7	2,4		10 ml
23 kg	460	7,7	3,8	2,6		10 ml
24 kg	480	8,0	4,0	2,7		10 ml
25 kg	500	8,3	4,2	2,8		10 ml
26 kg	520	8,7	4,3	2,9		10 ml
27 kg	540	9,0	4,5	3,0		10 ml
28 kg	560	9,3	4,7	3,1		10 ml
29 kg	580	9,7	4,8	3,2		10 ml
30 kg	600	10,0	5,0	3,3		10 ml
31 kg	620	10,3	5,2	3,4		10 ml
32 kg	640	10,7	5,3	3,6		10 ml
33 kg	660	11,0	5,5	3,7		10 ml
34 kg	680	11,3	5,7	3,8		10 ml
35 kg	700	11,7	5,8	3,9		10 ml
36 kg	720	12,0	6,0	4,0		10 ml
37 kg	740	12,3	6,2	4,1		10 ml
38 kg	760	12,7	6,3	4,2		10 ml
39 kg	780	13,0	6,5	4,3		10 ml
40 kg	800	13,3	6,7	4,4		10 ml
42 kg	840	14,0	7,0	4,7		10 ml
44 kg	880	14,7	7,3	4,9		10 ml
46 kg	920	15,3	7,7	5,1		10 ml
48 kg	960	16,0	8,0	5,3		10 ml
50 kg	1000	16,7	8,3	5,6		10 ml

Dygnsdosering 40 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygndos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	120	2,0	1,0	0,7	1 ml	
4 kg	160	2,7	1,3	0,9	1 ml	10 ml
5 kg	200	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml
6 kg	240	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
7 kg	280	4,7	2,3	1,6		10 ml
8 kg	320	5,3	2,7	1,8		10 ml
9 kg	360	6,0	3,0	2,0		10 ml
10 kg	400	6,7	3,3	2,2		10 ml
11 kg	440	7,3	3,7	2,4		10 ml
12 kg	480	8,0	4,0	2,7		10 ml
13 kg	520	8,7	4,3	2,9		10 ml
14 kg	560	9,3	4,7	3,1		10 ml
15 kg	600	10,0	5,0	3,3		10 ml
16 kg	640	10,7	5,3	3,6		10 ml
17 kg	680	11,3	5,7	3,8		10 ml
18 kg	720	12,00	6,0	4,0		10 ml
19 kg	760	12,7	6,3	4,2		10 ml
20 kg	800	13,3	6,7	4,4		10 ml
21 kg	840	14,0	7,0	4,7		10 ml
22 kg	880	14,7	7,3	4,9		10 ml
23 kg	920	15,3	7,7	5,1		10 ml
24 kg	960	16,0	8,0	5,3		10 ml
25 kg	1000	16,7	8,3	5,6		10 ml
26 kg	1040	17,3	8,7	5,8		10 ml
27 kg	1080	18,0	9,0	6,0		10 ml
28 kg	1120	18,7	9,3	6,2		10 ml
29 kg	1160	19,3	9,7	6,4		10 ml
30 kg	1200	20,0	10,0	6,7		10 ml
31 kg	1240	20,7	10,3	6,9		10 ml
32 kg	1280	21,3	10,7	7,1		10 ml
33 kg	1320	22,0	11,0	7,3		10 ml
34 kg	1360	22,7	11,3	7,6		10 ml
35 kg	1400	23,3	11,7	7,8		10 ml
36 kg	1440	24,0	12,0	8,0		10 ml
37 kg	1480	24,7	12,3	8,2		10 ml
38 kg	1520	25,3	12,7	8,4		10 ml
39 kg	1560	26,0	13,0	8,7		10 ml
40 kg	1600	26,7	13,3	8,9		10 ml
42 kg	1680	28,0	14,0	9,3		10 ml
44 kg	1760	29,3	14,7	9,8		10 ml
46 kg	1840	30,7	15,3	10,2		10 ml
48 kg	1920	32,0	16,0	10,7		10 ml
50 kg	2000	33,3	16,7	11,1		10 ml

1) Dosering enligt FASS text för Absenor® oral lösning 60 mg/ml
2) Tabellen är baserad på intial behandling och dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.

Doseringstabell för Absenor® orala droppar 200 mg/ml (dygnsdos 20-40 mg/kg kroppsvikt¹⁾)

Pediatrisk population

Till barn utan annan antiepileptisk behandling ges initialt 20–40 mg/kg kroppsvikt delat på 2–3 doser i samband med måltid. Dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.²

Absenor orala droppar 200 mg/ml (≤ 1,5 ml är markerade i grön, vänligen använd 1 ml doseringsspruta.)

Dygnsdosering 20 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygnsdos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	60	0,3	0,2	0,1	1 ml	
4 kg	80	0,4	0,2	0,1	1 ml	
5 kg	100	0,5	0,3	0,2	1 ml	
6 kg	120	0,6	0,3	0,2	1 ml	
7 kg	140	0,7	0,4	0,2	1 ml	
8 kg	160	0,8	0,4	0,3	1 ml	
9 kg	180	0,9	0,5	0,3	1 ml	
10 kg	200	1,0	0,5	0,3	1 ml	
11 kg	220	1,1	0,6	0,4	1 ml	
12 kg	240	1,2	0,6	0,4	1 ml	
13 kg	260	1,3	0,7	0,4	1 ml	
14 kg	280	1,4	0,7	0,5	1 ml	
15 kg	300	1,5	0,8	0,5	1 ml	
16 kg	320	1,6	0,8	0,5	1 ml	
17 kg	340	1,7	0,9	0,6	1 ml	
18 kg	360	1,8	0,9	0,6	1 ml	
19 kg	380	1,9	1,0	0,6	1 ml	
20 kg	400	2,0	1,0	0,7	1 ml	
21 kg	420	2,1	1,1	0,7	1 ml	10 ml
22 kg	440	2,2	1,1	0,7	1 ml	10 ml
23 kg	460	2,3	1,2	0,8	1 ml	10 ml
24 kg	480	2,4	1,2	0,8	1 ml	10 ml
25 kg	500	2,5	1,3	0,8	1 ml	10 ml
26 kg	520	2,6	1,3	0,9	1 ml	10 ml
27 kg	540	2,7	1,4	0,9	1 ml	10 ml
28 kg	560	2,8	1,4	0,9	1 ml	10 ml
29 kg	580	2,9	1,5	1,0	1 ml	10 ml
30 kg	600	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml
31 kg	620	3,1	1,6	1,0	1 ml	10 ml
32 kg	640	3,2	1,6	1,1	1 ml	10 ml
33 kg	660	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml
34 kg	680	3,4	1,7	1,1	1 ml	10 ml
35 kg	700	3,5	1,8	1,2	1 ml	10 ml
36 kg	720	3,6	1,8	1,2	1 ml	10 ml
37 kg	740	3,7	1,9	1,2	1 ml	10 ml
38 kg	760	3,8	1,9	1,3	1 ml	10 ml
39 kg	780	3,9	2,0	1,3	1 ml	10 ml
40 kg	800	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
42 kg	840	4,2	2,1	1,4	1 ml	10 ml
44 kg	880	4,4	2,2	1,5	1 ml	10 ml
46 kg	920	4,6	2,3	1,5	1 ml	10 ml
48 kg	960	4,8	2,4	1,6		10 ml
50 kg	1000	5,0	2,5	1,7		10 ml

Dygnsdosering 40 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygndos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	120	0,6	0,3	0,2	1 ml	
4 kg	160	0,8	0,4	0,3	1 ml	
5 kg	200	1,0	0,5	0,3	1 ml	
6 kg	240	1,2	0,6	0,4	1 ml	
7 kg	280	1,4	0,7	0,5	1 ml	
8 kg	320	1,6	0,8	0,5	1 ml	
9 kg	360	1,8	0,9	0,6	1 ml	
10 kg	400	2,0	1,0	0,7	1 ml	
11 kg	440	2,2	1,1	0,7	1 ml	10 ml
12 kg	480	2,4	1,2	0,8	1 ml	10 ml
13 kg	520	2,6	1,3	0,9	1 ml	10 ml
14 kg	560	2,8	1,4	0,9	1 ml	10 ml
15 kg	600	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml
16 kg	640	3,2	1,6	1,1	1 ml	10 ml
17 kg	680	3,4	1,7	1,1	1 ml	10 ml
18 kg	720	3,6	1,8	1,2	1 ml	10 ml
19 kg	760	3,8	1,9	1,3	1 ml	10 ml
20 kg	800	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
21 kg	840	4,2	2,1	1,4	1 ml	10 ml
22 kg	880	4,4	2,2	1,5	1 ml	10 ml
23 kg	920	4,6	2,3	1,5	1 ml	10 ml
24 kg	960	4,8	2,4	1,6		10 ml
25 kg	1000	5,0	2,5	1,7		10 ml
26 kg	1040	5,2	2,6	1,7		10 ml
27 kg	1080	5,4	2,7	1,8		10 ml
28 kg	1120	5,6	2,8	1,9		10 ml
29 kg	1160	5,8	2,9	1,9		10 ml
30 kg	1200	6,0	3,0	2,0		10 ml
31 kg	1240	6,2	3,1	2,1		10 ml
32 kg	1280	6,4	3,2	2,1		10 ml
33 kg	1320	6,6	3,3	2,2		10 ml
34 kg	1360	6,8	3,4	2,3		10 ml
35 kg	1400	7,0	3,5	2,3		10 ml
36 kg	1440	7,2	3,6	2,4		10 ml
37 kg	1480	7,4	3,7	2,5		10 ml
38 kg	1520	7,6	3,8	2,5		10 ml
39 kg	1560	7,8	3,9	2,6		10 ml
40 kg	1600	8,0	4,0	2,7		10 ml
42 kg	1680	8,4	4,2	2,8		10 ml
44 kg	1760	8,8	4,4	2,9		10 ml
46 kg	1840	9,2	4,6	3,1		10 ml
48 kg	1920	9,6	4,8	3,2		10 ml
50 kg	2000	10,0	5,0	3,3		10 ml

1) Dosering enligt FASS text för Absenor® oral droppar 200 mg/ml
2) Tabellen är baserad på intial behandling och dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Absenor® (natriumvalproat) Enterotabletter 100 mg 300 mg och 500 mg. Orala droppar lösning 200 mg/ml. Oral lösning 60 mg/ml. **Absenor® Depot** (natriumvalproat) Depottabletter 300 mg och 500 mg. ATC-kod N03AG01, antiepileptika [Rx] F.

Indikation och subvention: Epilepsi. Generaliserade epilepsianfall såsom tonisk-kloniska anfall (grand mal), absenser (petit mal), myoklona anfall och atoniska anfall. Partiella (fokala) anfall. Behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom när litium är kontraindicerat eller inte tolereras. Fortsatt behandling efter den maniska episoden kan övervägas hos patienter som har svarat på natriumnatriumvalproat vid akut mani. **Försiktighet och varningar:** Natriumvalproat är kontraindicerat vid leverinsufficiens, porfyri, mitokondriell sjukdom och vid ökad risk för karnitinbrist, rubbning i ureacykeln och överkänslighet mot natriumvalproat, jordnötter, soja eller ingående hjälpämne. Natriumvalproat har en hög teratogen potential och är även kontraindicerat hos fertila kvinnor om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda samt vid graviditet, förutom vid behandling av epilepsi där inget annat lämpligt alternativ finns. Natriumvalproat utsöndras i bröstmjolk, beslut måste tas om att antingen avsluta amningen eller avstå behandlingen. Det föreligger en ökad risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med natriumvalproat inom 3 månader före befruktningen. Förskrivare ska diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos manliga och kvinnliga partners. **Natriumvalproat ska förskrivas och dispenserar enligt graviditetspreventionsprogrammet. Senaste översyn av produktresumé: 2025-11-28. För priser och ytterligare information se www.fass.se.**