

Kranskärslssjukdom – Information du kan ha nytta av inför behandlingen med Xarelto® (rivaroxaban)

Du har fått den här informationen därför att din läkare har ordinerat dig Xarelto som behandling av kranskärslssjukdom. Informationen hjälper dig förstå sjukdomen och varför det är viktigt att du tar Xarelto enligt ordination.

Om du vill ha mer information om kranskärslssjukdom kan du vända dig till din läkare.

För fullständighet användarinformation, ta noga del av informationen i bipacksedeln som följer med i läkemedelsförpackningen eller gå in på www.fass.se.

Varför behöver jag behandling?

Kranskärslssjukdom påverkar kranskärlen (artärerna) som omsluter hjärtat.¹

Sjukdomen börjar med att inlagringar av fett bildas inne i kranskärnen och försämrar blodförsörjningen av hjärtat. Ibland bildas en blodpropp ovanpå fettinlagringen så att kranskärlet blockeras helt eller delvis så att hjärtat plötsligt får en plötsligt försämrad blodförsörjning. Det är det som kallas hjärtinfarkt.^{2,3}

Minimera risken

Det finns oftast kvar fettinlagringar i andra kranskärn och det gör att en blodpropp kan bildas i andra kärn. För att minska risken att detta ska hända kan du och din läkare hjälpas åt.

Varför Xarelto®?

Din läkare har ordinerat Xarelto i kombination med acetylsalicylsyra som en del av din behandlingsplan mot kranskärslssjukdom. Syftet med det är att minska risken för att en blodpropp ska bildas och därmed minska din risk för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

Vad är Xarelto och acetylsalicylsyra?

Xarelto är ett läkemedel som minskar risken för att blodproppar ska bildas i kranskärnen genom att det gör blodet lite tunnare. Acetylsalicylsyra verkar också förtunnande på blodet.

Varför ska jag ta båda tillsammans?

Acetylsalicylsyra och Xarelto förtunnar blodet på olika sätt, och det är mer effektivt att ta båda tillsammans än bara den ena.

Kombinationen av Xarelto och acetylsalicylsyra kan minska risken för hjärtinfarkt och stroke mer effektivt än enbart acetylsalicylsyra.

Hur verkar Xarelto® och acetylsalicylsyra?

Xarelto minskar bildningen av fibrinnät (nätet som bildar blodproppen) medan acetylsalicylsyra minskar aktiveringen av blodplättar (cellerna som fäster nätet). Tillsammans minskar de risken för att en blodpropp ska bildas i dina kranskärn.

Hur tar jag Xarelto® och acetylsalicylsyra?

Du behöver ta Xarelto två gånger om dagen, och acetylsalicylsyra en gång om dagen. Det finns några knep du kan använda för att komma ihåg att ta din medicin. Brukar du alltid äta vid samma tider? Eller finns det något du använder två gånger om dagen (till exempel din tandborste)?

Acetylsalicylsyra 75 mg en gång om dagen (på morgonen ELLER på kvällen). **Xarelto 2,5 mg** två gånger om dagen (på morgonen OCH på kvällen).

Ta aldrig dubbel dos av Xarelto eller acetylsalicylsyra för att kompensera för en glömd dos.

Hur länge ska jag ta Xarelto®?

Hur länge du ska stå på din behandling avgörs av din läkare.

Vad mer behöver jag veta om att ta Xarelto®?

Patientkort Du får ett patientkort som informerar vårdpersonal om att du tar ett blodförtunnande läkemedel. Visa det för alla läkare, tandläkare och sjuksköterskor som behandlar dig och ha det alltid med dig (till exempel i plånboken) ifall du skulle råka ut för en olycka eller blir akut sjuk.

Vad mer kan jag göra?

Kom ihåg att det är mycket viktigt att du tar medicinen enligt din läkares anvisningar. Men du kan hjälpa kranskärnen på andra sätt också:³

- ◆ Sluta röka
- ◆ Motionera regelbundet
- ◆ Gå ner i vikt, om du behöver det
- ◆ Ät nyttigt

Om du tagit för mycket Xarelto®

Kontakta sjukvården omedelbart om du har tagit för många tabletter. Risken för blödning ökar om du tar för mycket Xarelto.

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar men alla användare drabbas inte. Kontakta din mottagning för råd om du börjar blöda från t.ex. näsa, mun, urinvägar eller mage/tarm. Får du en kraftig blödning eller en blödning som inte slutar av sig själv ska du söka akutsjukvård. Om du får ett kraftigt slag mot mage, bröst eller huvud ska du också söka akutsjukvård för att kontrollera att du inte har fått någon inre blödning. Sök akutsjukvård även vid vid ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk, oförklarlig svullnad, ökad andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp, symtom som kan vara tecken på blödning.

Tillsammans med andra läkemedel

Ta inte antiinflammatoriska läkemedel som t.ex. Voltaren, Naproxen eller ytterligare acetylsalicylsyra utan att först ha frågat din läkare. Värktabletter som innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon och Panodil går bra att ta tillsammans med Xarelto. **Det är viktigt att du informerar din läkare om vilka andra läkemedel du eventuellt använder, det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Använder du antidepressiva läkemedel av typen SSRI bör du också tala om det för din läkare.** Din läkare avgör hur du ska göra med behandlingen.

Restriktioner

Kontakta din läkare:

- ♦ om du är allergisk, överkänslig, mot rivaroxaban eller mot något av övriga ämnen i Xarelto
- ♦ om du blöder mycket, eller har en pågående blödning
- ♦ om du har en leversjukdom eller annat tillstånd som leder till ökad blödningsrisk
- ♦ om du är gravid eller ammar
- ♦ om du ska genomgå en planerad operation eller biopsi

Kontakta din tandläkare om du t.ex. ska dra ut en tand, och informera om att du behandlas med Xarelto. Kontakta också din läkare om du planerar att bli gravid.

OBS: Detta häfte ersätter inte råd och anvisningar från din läkare eller annan vårdpersonal.

Referenser:

1. Mayo Clinic. Coronary artery disease. Online på: <https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/coronary-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350613> [senast läst maj 2020].
2. Heart & Stroke Foundation. Coronary Artery Disease. Online på: <https://www.heartandstroke.ca/heart/conditions/coronary-artery-disease> [senast läst maj 2020].
3. NHS Choices. Atherosclerosis (arteriosclerosis). Online på: <https://www.nhs.uk/conditions/atherosclerosis/> [senast läst maj 2020].

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, **R** (B01 AF01). Tabletter 2,5 mg (F).

Indikation: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. **Dosering:** Den rekommenderade dosen är Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inkluderar

sive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. **Varningar och försiktighet:** Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Administrering av Xarelto bör avbrytas om svår blödning uppstår. Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopido­gre­l eller tiklopidin. Nyttan och risken med behandlingen ska regelbundet utvärderas för varje enskild individ. Datum för senaste översynen av produktresumén december 2022. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Före förskrivning vänligen läs produktresumén på fass.se MA-M_Riv-SE-0142-3. December 2022

