



Till dig som behandlas med Xarelto®

**Xarelto förebygger att blodproppar bildas
efter din höft- eller knäprotesoperation**

Patientinformation

Varför har jag fått Xarelto®?

Du har fått Xarelto för att du nyligen genomgått en höftprotes- eller knäprotesoperation. Efter en sådan operation finns det en ökad risk för blodproppsbildning i benen och/eller lungorna.

Xarelto är ett läkemedel som förebygger att blodproppar bildas, en så kallad antikoagulant. Hittills har man använt sprutor för att förebygga blodproppar, men nu finns tabletter i form av Xarelto istället.


Hur ska jag ta Xarelto®?

Följ ordinationen din läkare gett dig. Vanligtvis ska du ta Xarelto i upp till 5 veckor efter din höftprotesoperation och i 2 veckor om du genomgått en knäprotesoperation. Xarelto kan tas antingen med eller utan mat. Försök att ta Xarelto på samma tidpunkt var dag.

Om jag missat att ta en tablett eller tagit för mycket, vad ska jag göra då?

Ta tablettens så snart som möjligt och sedan nästa tablett dagen efter. Ta inte dubbel dos om du glömt att ta en tablett.

Om du har tagit för mycket Xarelto ska du snarast kontakta ditt sjukhus.



Annat viktigt som jag bör tänka på!

Efter en höftprotes- eller knäprotesoperation är det vanligt att man upplever smärta och svullnad i benet, dessa besvär brukar långsamt förbättras.

Om du upplever ökade smärtor i benet eller att svullnaden av någon anledning förvärras, ska du kontakta ditt sjukhus.

Om du upplever plötslig insättande andnöd eller börjar blöda, ska du också kontakta ditt sjukhus.

Bra att känna till

- ♦ Xarelto är ett läkemedel som förebygger att blodproppar bildas, en så kallad antikoagulant
- ♦ Följ ordinationen din läkare gett dig
- ♦ Om du upplever att smärtan förändras, du börjar svullna, får plötslig andnöd eller börjar blöda, ska du kontakta ditt sjukhus

Innan du påbörjar din behandling med Xarelto, ta noga del av informationen i bipacksedeln.

- ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.



Bayer

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00