

Till dig som blivit ordinerad HyQvia (Humant normalt immunglobulin). Detta kort lämnas ut av sjukvårdspersonal.

HyQvia kan förvaras i rumstemperatur¹

- ✓ Det betyder att HyQvia får tas ut ur kylskåpet och förvaras i temperaturer över +8 °C och under +25 °C i **upp till 3 månader**.
- ✓ Förvara inte i kylskåp efter förvaring i rumstemperatur.
- ✓ HyQvia ska kasseras efter 3 månaders förvaring i rumstemperatur eller när utgångsdatum nåtts, beroende på vilket som inträffar först.
- ✓ Skriv datumet då läkemedlet tas ut ur kylskåpet på ytterkartongen så att du undviker att det kasseras i onödan.



LÄS BIPACKSEDELN NOGA* eller på www.fass.se (allmänhet)

Referens: 1. HyQvia bipacksedel (www.fass.se)

*Notera att det kan dröja innan den tryckta bipacksedeln i förpackningen är uppdaterad med de senaste ändringarna.



HyQvia

Humant normalt immunglobulin (10%)

Rekombinant humant hyaluronidas

C-ANPROM/SE/HYQ/0026 Juni 2025

HyQvia (humant normalt immunglobulin), 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning för subkutan användning. **Vad HyQvia är och vad det används för:** HyQvia består av en flaska med immunglobulin och en flaska med hyaluronidas. Immunglobuliner kallas också antikroppar och finns i blodet hos friska människor. Hyaluronidas hjälper immunglobulin att komma ut i blodet. HyQvia används hos patienter med svagt immunsystem, som inte har tillräckligt med antikroppar i blodet och ofta drabbas av infektioner, för att höja låga immunglobulinnivåer till normala nivåer (ersättningsterapi). HyQvia används hos vuxna, barn och ungdomar (0 till 18 år) med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP), en form av autoimmun sjukdom som kännetecknas av kronisk inflammation i de perifera nerverna, för att hjälpa till att skydda nerverna från att skadas av immunsystemet. **Använd inte HyQvia:** Om du är allergisk mot immunglobuliner, hyaluronidas, rekombinant hyaluronidas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har antikroppar mot immunglobulin A (IgA) i blodet (brist på IgA). Infundera inte i ett blodkärl (intravenöst) eller i en muskel (intramuskulärt). **Varningar och försiktighet:** Allergiska reaktioner som plötsligt blodtrycksfall eller anafylaktisk chock är sällsynta, men kan ibland förekomma även om du inte har haft problem vid liknande behandlingar tidigare. Tecken eller symtom på dessa sällsynta allergiska reaktioner omfattar: berusningskänsla, yrsel, svimningskänsla; hudutslag och klåda, svullnad i munnen eller i halsen, svårighet att andas, väsande andning; onormal hjärtrytm, bröstsmärtor, blå läppar, fingrar eller tår samt suddig syn. Om du märker något av dessa tecken under infusionerna ska du omedelbart berätta det för läkaren eller sjuksköterskan. Immunglobuliner kan öka risken för hjärtinfarkt, stroke, blodproppar i lungan eller blockering av

blodkärl i benet, om än mycket sällan. Om du märker något av dessa tecken och symtom, inklusive andfåddhet, smärta, svullnad av en kroppsdel och bröstsmärta under infusionen, ska du omedelbart berätta detta för läkaren eller sjuksköterskan. Inflammation i membranen som omger hjärnan och ryggmärgen (aseptisk meningit) har rapporterats förekomma. Om du märker något av dessa tecken och symtom, inklusive svår huvudvärk, stel nacke, dåsighet, feber, ljuskänslighet (fotofobi), illamående och kräkningar efter infusionen, ska du omedelbart berätta detta för läkaren eller sjuksköterskan. Du ska alltid övervakas under infusionerna och i minst 20 minuter därefter, i vissa fall längre tid. Vid behandling i hemmet måste du och din vårdare vara uppmärksamma på tidiga tecken på biverkningar under infusionen. Vid biverkning, avbryt infusionen omedelbart och kontakta läkare. Vid allvarlig biverkning, sök akut hjälp. Det är mycket viktigt att infundera läkemedlet i rätt hastighet (läkare eller sjuksköterska ger dig lämpliga råd om det). Ifundera inte HyQvia i eller runt ett infekterat eller rött och svullet område på huden. Innan du tar ett blodprov eller vaccinerar dig, tala med läkare om din behandling med HyQvia. Notera följande information i infusionsdagboken efter varje infusion HyQvia: produktnamn, datum, tillverknings-satsnummer, injicerad volym, infusionshastighet, och infusionsställe(n). Du kan uppleva biverkningar (till exempel yrsel eller illamående) under behandling med HyQvia som kan påverka körförmågan och förmågan att använda maskiner. Om det händer, vänta tills reaktionerna har gått över. HyQvia ska endast användas av gravida eller ammande kvinnor efter diskussion med läkaren. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda HyQvia.** Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 04/2025.

Takeda Pharma AB, Telefon: 08-731 28 00, E-post: infosweden@takeda.com, www.takeda.se

