



Information till dig som skall påbörja behandling med Retsevmo® (selperkatinib)

Retsevmo® och Lilly är registrerade varumärken som tillhör Eli Lilly and Company.
© 2025 Eli Lilly and Company. Med ensamrätt.
PP-SE-SE-0055 11.2025

Lilly
A MEDICINE COMPANY

Denna broschyr är ursprungligen framtagen i samarbete med sjuksköterska Ing-Marie Nilsson, Lung- och allergikliniken, Skånes Universitetssjukhus, SuS Lund, 2021. Uppdaterad senast i oktober 2025.

Inledning

Om du läser den här texten, så har du blivit ordinerad av din läkare att påbörja behandling med Retsevmu. Retsevmu är ett receptbelagt cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen seliperkatinaib.

I broschyren får du mer information om vad Retsevmu är, hur du ska ta läkemedlet och vad du behöver vara uppmärksam på. **Läs också noga igenom bipacksedel innan du börjar ta läkemedlet. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Innehållsförteckning:

Inledning	3
Retsevmu – målriktad behandling	4
Vad du behöver veta innan du tar Retsevmu	4
Så här ska du ta Retsevmu tabletter	5
Interaktioner	6
Graviditet och amning	7
Biverkningar	7
Läkarundersökningar före och under behandlingen	8
Vad kan man göra själv?	9
Bilkörning	10
Hur Retsevmu ska förvaras	10
Att söka mer information	10
Sidor för dagboksnoteringar	11
Lär dig mer om din behandling	15
Rapportering av biverkningar	15



Retsevmo – målriktad behandling

Det kan finnas olika orsaker till cancersjukdom. I vissa fall finns en s.k. drivande mutation, en förändring i en viss gen, som gör att cancer växer. En av dessa förändringar kallas *RET*. Vissa former av cancer såsom lung- och tyreoidcancer (cancer i sköldkörteln) men även andra tumörsorter kan ha den här genförändringen. Man säger då att cancer är *RET*-positiv.

Retsevmo riktar sig mot just denna förändring och används vid:

- En typ av lungcancer, så kallad icke-småcellig lungcancer, hos vuxna som inte tidigare har behandlats med *RET*-hämmande läkemedel.
- Sköldkörtelcancer (alla typer) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre om behandling med radioaktiv jod, där lämpligt, inte har fungerat.
- En sällsynt typ av sköldkörtelcancer som kallas medullär sköldkörtelcancer, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.
- Solida tumörer (cancer) i andra delar av kroppen hos vuxna efter att tidigare behandlingar inte har lyckats med att kontrollera cancer.

Behandlingen kan göra tumörtillväxten långsammare, stoppa upp den helt eller i vissa fall till och med krympa tumören.

Vad du behöver veta innan du tar Retsevmo - varningar och försiktighet

Ta inte Retsevmo om du är allergisk mot selperkatiniib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Tala med läkare innan du tar Retsevmo:

- om du har lung- eller andningsproblem som inte beror på lungcancer
- om du har högt blodtryck
- om du har en förändring på EKG (elektrokardiogram), så kallat förlängd QT-intervall
- om du tidigare har haft en större blödning
- om du har problem med din sköldkörtel eller nivåerna av sköldkörtelhormon
- En snabb nedbrytning av cancerceller (tumörlyssyndrom, TLS) kan inträffa när du tar Retsevmo. Detta kan orsaka oregelbundna hjärtslag, njursvikt eller onormala blodprovresultat. Tala med din läkare om du tidigare har haft njurproblem eller lågt blodtryck eftersom detta kan öka riskerna förknippade med TLS.

- Retsevmo kan orsaka oregelbunden tillväxt eller skada på höftleden hos pediatrika patienter (<18 år). Om du upplever smärta i höft eller knä eller haltar oförklarligt, tala med din läkare.

Retsevmo kan påverka fertiliteten hos män och kvinnor och därmed din förmåga att få barn. Tala med läkaren om du oroar dig över detta.

Så här ska du ta Retsevmo tabletterna

Tabletterna ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Försök ta dem vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela, de får inte delas, krossas eller tuggas. Ta läkemedlet med ett stort glas vatten. Man kan ta dem med eller utan mat. Men här finns ett viktigt undantag. Läs nedan om interaktioner.



Kl 8: här tar du Retsevmo



Kl 20: här tar du Retsevmo

Här är ett förslag på hur du kan ta tabletterna. Det går bra att välja andra tidpunkter, bara tidsavståndet mellan tabletterna blir rätt.

Det finns två olika styrkor, 40 mg och 80 mg, och din läkare har bestämt vilken dos som är lämplig för dig. Tabletterna levereras i en blisterförpackning.

Retsevmo tabletter



80 mg



40 mg

Troligen ser doseringen ut så här:

Om du väger över 50 kg, så är dosen 160 mg (du tar två 80 mg tabletter vid varje doseringstillfälle).

Om du väger under 50 kg, startar du med 120 mg (du tar tre 40 mg tabletter eller en 40 mg och en 80 mg tablett vid varje doseringstillfälle).

Observera att detta är de rekommenderade startdoserna. Om du skulle få biverkningar (se nedan) eller av andra skäl, så kanske din doktor väljer att förändra dosen.

Om du råkar glömma ta medicinen vid något tillfälle, så ska du ta nästa dos som vanligt. Man tar inte någon extrados för att kompensera för den som missats. Samma sak gäller om du kräks när du tagit medicinen.

Du ska fortsätta att ta Retsevmu så länge du har nytta av det. Sluta inte med medicinen på egen hand. Om du får biverkningar, ska du prata med din doktor eller sjuksköterska, se nedan. Ibland kan man behöva minska på dosen.

Interaktioner

När olika läkemedel påverkar varandra, säger man att det finns en interaktion eller att läkemedlen interagerar med varandra. Det kan betyda att det ena läkemedlet gör att det andra tas upp sämre eller att effekten blir alldeles för stark, så att oönskade biverkningar uppstår.

Om du också har behandling med en protonspumpshämmare, såsom Omeprazol, (medicin mot magkatarr) så måste du ta Retsevmu tillsammans med mat. Det beror på att läkemedlen annars kan påverka varandra.

Om du tar en H₂-receptorantagonist, såsom ranitidin eller famotidin (Pepcid), så gäller det att hålla koll på tiden. Du måste nämligen ta Retsevmu två timmar före detta läkemedel. Det ska också vara tio timmar kvar till nästa dos Retsevmu när du tar Pepcid-tabletten.

Man kan ta dem med eller utan mat. Men här finns ett viktigt undantag. Läs nedan om interaktioner.



Det finns fler läkemedel som kan påverka eller påverkas av Retsevmu, så det är viktigt att din läkare är informerad om vilka läkemedel du använder, både sådana du fått på recept, receptfria läkemedel och ev hälsokostpreparat. Du bör undvika Johannesört, ett receptfritt rogivande preparat, som kan minska Retsevmus effekt.

Graviditet och amning

Retsevmo kan påverka dina framtida möjligheter att skaffa barn, detta gäller både för män och kvinnor. Prata gärna med din doktor om du behöver.

Det är viktigt att undvika graviditet under behandlingen, eftersom läkemedlet kan vara skadligt för foster. Fertila kvinnor samt män, vars partner är en fertil kvinna, måste använda effektiva preventivmedel under hela behandlingstiden och minst en vecka efter sista dosen.

Man vet inte om Retsevmo utsöndras i bröstmjölk. Då man inte kan utesluta en risk för barnet, ska amning inte ske under behandlingen.



Biverkningar

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Se sid 15 om hur du rapporterar biverkningar.

Alla läkemedel kan ge biverkningar. Det är inte alls säkert att alla patienter får besvär, men här kommer en beskrivning av eventuella biverkningar vid Retsevmo-behandling.

Om du får något av detta, så ska du kontakta din läkare eller sjuksköterska:

- Lung- eller andningsproblem som andfåddhet, hosta och förhöjd temperatur och som inte beror på lungcancer
- Gulfärgning i huden och/eller ögonvitorna. Man kan också märka att urinen blir mörkare än vanligt, om man tappar aptiten eller får ont i höger sidan av magen. Detta kan bero på att din lever påverkats av läkemedlet. Sådan leverpåverkan syns också på blodprover
- Allergisk reaktion, som ger sig till känna med feber och muskelvärk, följt av hudutslag
- Förhöjt blodtryck
- Blödningar, t.ex. blodiga upphostningar

Andra typer av biverkningar:

- Besvär från mag-tarmkanalen, som diarré, förstoppning, illamående, kräkning, buksmärta, nedsatt aptit
- Huvudvärk, yrsel
- Feber
- Trötthet
- Vätskeansamling som kan ge svullna händer eller fotleder
- Muntorrhet
- Hudustlag
- Impotens
- Låga nivåer hemoglobin som kan leda till blodbrist
- Minskat antal blodplättar, vilket kan leda till blödningar och/eller blåmärken
- Minskat antal vita blodkroppar
- Förhöjt kreatinivärde, ett blodprov som visar njurarnas funktion
- Förhöjt alkalisk fosfatase och total bilirubin
- Låga nivåer av natrium, kalium, magnesium, kalcium eller albumin i blodet
- Onormalt EKG
- Infektion i urinvägar
- Symtom på blödningar
- Inflammation i munnens slemhinna
- Minskad sköldkörtelfunktion

Tänk på att du ska meddela din doktor eller sjuksköterska om du får några besvär. Många gånger finns det hjälp att få, bara man berättar vilka besvär man har.

Läkarundersökningar före och under behandlingen

- Retsevmo kan orsaka allvarlig, livshotande inflammation i lungorna. Din läkare kommer att övervaka dig före och under behandling med Retsevmo med avseende på symtom. Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på lungproblem, inklusive andfåddhet, hosta och förhöjd temperatur.
- Retsevmo kan påverka blodtrycket. Blodtrycket mäts före och under behandlingen med Retsevmo.
- Retsevmo kan påverka leverfunktionen. Tala omedelbart om för läkaren om du får symtom på leverpåverkan såsom gulshot (gulfärgning av hud och ögon), nedsatt aptit, illamående eller kräkningar, eller om du får ont i övre högra sidan av buken. Blodprover som undersöker leverfunktionen kommer tas före och regelbundet under behandlingen.

-
- Retsevmo kan leda till onormalt EKG. EKG tas både före och under behandlingen med Retsevmo. Tala om för läkaren om du svimmar eftersom det kan vara ett symtom på onormalt EKG.
 - Retsevmo kan påverka hur din sköldkörtel fungerar. Din läkare kommer att övervaka din sköldkörtelfunktion före och under behandling med Retsevmo.
 - Före och under behandlingen med Retsevmo tas blodprover med jämna mellanrum för att kontrollera elektrolyter.
 - Om du är under 18 år kan din läkare komma att övervaka din tillväxt under behandling. Om du har smärta i höfter, knän eller annan smärta i benen ska du tala om det för din läkare.

Vad kan man göra själv?

Vissa biverkningar kan man själv förebygga eller behandla.

Muntorrhet är en av de vanligaste biverkningarna vid behandling med Retsevmo. Om du får bekymmer med det, så kan du försöka med följande:

- Undvika torra och/eller söta produkter
- Sätta upp en fuktare i sovrummet
- Prova att använda sockerfria tuggummin eller hårda sugtabletter
- Apoteket kan tipsa om flera olika sorters läkemedel, som kan hjälpa
- Besök din tandläkare eller tandhygienist för kontroll och förebyggande åtgärder
- Dricka extra mycket vätska
- Undvik kaffe, alkohol och tobak, som kan torka ut munslemhinnan mer
- Äta mjukare mat

Diarré är en annan vanlig biverkan och det är klokt att skaffa sig ett stoppande läkemedel. Be din doktor om ett recept eller köp själv på apoteket. Om du får problem med diarré, tänk också på att dricka extra mycket vätska, undvika mat som förvärrar läget, som kål, bönor, kryddstark mat. Kontakta din doktor eller sjuksköterska om du behöver hjälp att få rätsida på detta.

Trötthet är ett annat vanligt besvär vid all cancerbehandling. Man brukar ofta använda det franska ordet fatigue för att beskriva den speciella trötthet, som det handlar om här. Ett tips kan vara att försöka komma ut och gå en runda varje dag – det finns vetenskapliga bevis för att det hjälper. Ta emot hjälp som erbjuds, kanske finns det någon som gärna hjälper dig med inköp etc. Försök sova ordentligt på natten.

Bilkörning

Om du får symtom som trötthet eller yrsel under behandlingen med Retsevmo, bör du vara extra försiktig om du ska framföra ett fordon eller använda maskiner.

Hur Retsevmo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om innerförseglingen är bruten eller visar tecken på att ha manipulerats.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

För mer information om Retsevmo läs bipacksedeln som du hittar i din förpackning eller på fass.se

Att söka mer information

Kanske vill du ta reda på mer om sjukdom och/eller behandling.

- **www.1177.se**
- Patientföreningen för lungcancer finns på telefon **020-88 55 33** eller **www.lungcancerforeningen.se**
- Patientföreningen för sköldkörtelsjukdom har web-adress **www.skoldkortelforbundet.se**
- Cancerfonden
- För dina anhöriga finns en speciell sajt, **www.cancerkompisar.se**. Här kan man få hjälp att hitta någon vars situation liknar ens egen, för stöd och samtal
- En annan sajt är **www.naracancer.se**, en informationskälla speciellt inriktad på unga som står nära någon som har cancer



Sidor för dagboksnoteringar

Ibland är det till hjälp att skriva dagbok över besvär som kan uppstå. Ta gärna hjälp av följande sidor för att föra lite noteringar över de första veckorna.

Kom ihåg att ta med Behandlingsdagboken till läkare/sjuksköterska när du är på uppföljningsbesök.

Först fyller du i lite om hur du mår innan du startar behandlingen.

Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter en vecka. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter två veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter tre veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter fyra veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter fem veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter sex veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter sju veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter åtta veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter nio veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter tio veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter elva veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Efter tolv veckor. Datum: _____

	Inga besvär	Lite besvär	Mycket besvär
Allmänt mående			
Mage-tarmfunktion			
Muntorrhet			
Trötthet			
Annat			

Lär dig mer om din behandling

Har du frågor angående Retsevmo, läs bipacksedelns patientinformation som medföljer läkemedelsförpackningen, eller tala med din läkare. Du kan också kontakta Eli Lillys medicinska information, som kan besvara frågor om Retsevmo.

Telefon: **08-737 88 00**

E-mail: **scan_medinfo@lilly.com**

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverkets hemsida **www.lakemedelsverket.se**.

Biverkningar och reklamationer kan också rapporteras till Lilly: Ring vår medicinska information på **08-737 88 00** eller skicka en e-post till **scan_medinfo@lilly.com**.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.



Eli Lilly Sverige AB, Gustav III Boulevard 42,
P.O. Box 721, 169 27 Solna,
Tel: 08-7378800, www.lilly.com/se

Retsevmo® och Lilly är registrerade varumärken som tillhör Eli Lilly and Company.
© 2025 Eli Lilly and Company. Med ensamrätt.
PP-SE-SE-0055 11.2025

Lilly
A MEDICINE COMPANY