


▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Hur du använder Izamby® (denosumab) injektion i förfylld spruta




Denna **snabbguide** informerar dig om stegen för injektion av Izamby®.

- **Läs noga bipacksedeln** som finns i varje förpackning med Izamby® eller gå in på www.fass.se. Den ger dig mer information om behandlingen.
- Använd inte Izamby® **om du är allergisk** mot denosumab eller mot något annat innehållsämne.
- Använd inte Izamby® om du har låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi).
- Innan du får injicera själv ska sjukvårdspersonal träna med dig och visa hur Izamby används.

STEG 1

FÖRVARING



FÖRVARAS I KYLSKÅP (2 °C - 8 °C)

- **Skydda mot ljus** genom att förvara sprutan i ytterkartongen. **Säkerställ** att den förvaras vid rätt temperatur, **får ej frysas**.

ANVÄND VID RUMSTEMPERATUR ÖVERSKRID INTE 25 °C

- För en behagligare injektion, låt kartongen med den förfyllda sprutan ligga i **rumstemperatur** i cirka **30 minuter** innan den ska användas. Överskrid inte 25 °C.

När kartongen har tagits ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur måste sprutan användas *inom* 30 dagar. Läkemedel ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Den förfyllda sprutan är endast till för engångsbruk.

STEG 2

FÖRBEREDELSE

Lösningen i den förfyllda sprutan ska vara **färglös** till **svagt gul**.

Använd inte den förfyllda sprutan om den:



innehåller
partiklar





är **grumlig**



verkar
sprucken
eller trasig




har **passerat**
utgångsdatum



- Använd **inte** den förfyllda sprutan om **nålhylsan saknas eller sitter löst**.
- När du ska greppa sprutan så ta i **sprut kroppen - inte i nålhylsan eller i kolven**.

STEG 3

INJEKTIONSSTÄLLE



- Izamby® kan injiceras i **utsidan av överarmen, övre delen av låret** eller i buken, dock ej närmare än 5 cm från naveln.
- Välj överarmen endast om någon annan ger dig injektionen.
- Izamby® ska injiceras under huden (subkutant).

STEG 4

INJICERA

- Rengör injektionsstället** med en spritservett och låt huden torka.
- Rör inte injektionsstället** före injektionen.

- Injicera inte** i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röd eller hård. **Undvik** att injicera i områden med ärr eller bristningar.



Blåmärken



Hård hud



Ärr




Öm hud



Röd hud



Bristningar



- Greppa den förfyllda sprutan genom att ta i sprutkroppen och **dra varsamt av nålhylsan** rakt ut och bort från kroppen. **Kasta** nålhylsan. Försök **inte sätta tillbaka** nålhylsan på nålen.
- Nyp ihop huden runt injektionsstället med ena handen och **stick med andra handen in nålen i 45 till 90 graders vinkel** i den hopnypta huden. Rör inte nålen under tiden. Det är viktigt att hålla huden hopnypt under hela injektionen.
- Tryck långsamt in kolven** hela vägen tills all lösning har injicerats, den förfyllda sprutan är tom och nålskyddet aktiveras.
- Om någon injicerar Izamby® åt dig ska de **nypa ihop huden i din överarm** med ena handen och injicera med den andra handen.

STEG 5

EFTER ANVÄNDNING

Kasta den förfyllda sprutan och nålhylsan i en behållare för stickande och skärande avfall. Släng dem inte i avloppet eller bland hushållsavfall.



STEG 6

PLANERA NÄSTA INJEKTION

Registrera datumet för din **nästa injektion** på påminnelsekortet som medföljer i förpackningen.

Månad 1

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Månad 6

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				