

GOBIVAZ® (golimumab)

Patientkort

Namn, patient:

.....

Namn, läkare:

.....

Telefonnummer, läkare:

.....

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och underbehandlingen med Gobivaz. Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare. Läs bipacksedeln om Gobivaz noga innan du börjar använda detta läkemedel.

Datum för påbörjad behandling med Gobivaz:

.....

Senaste behandlingar:

.....

Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsatsnumret på ditt läkemedel. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:

Undersökning:

.....

Datum:

.....

Resultat:

.....

Undersökning:

.....

Datum:

.....

Resultat:

.....

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Lista över allergier:

.....

Lista över andra läkemedel:

.....

Infektioner

Före behandling med Gobivaz

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B virus.

Under behandling med Gobivaz

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinerings eller influensaliknande symtom.

Graviditet, amning och vaccinationer

Om du har fått Gobivaz under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få 'levande vacciner', såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Gobivaz-dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.