

Dosering av Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Risk för felmedicinering som leder till oavsiktlig överdosering

Var noga vid förskrivning och administrering av Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning för att undvika **feldosering till följd av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml)**, då detta kan leda till **oavsiktlig överdosering och död**. Vid ordination, inkludera både **dosen i milligram och motsvarande volym i milliliter**. **Dosen och volymen beror på patientens vikt.**

Det har även förekommit misstag som lett till allvarlig hepatotoxicitet i samband med oavsiktlig överdosering till vuxna som väger ≤ 50 kg (som kräver viktbaserad dosering av 60 mg/kg utan att överskrida 3 g).

Terapeutiska indikationer

Korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, och feber. Se även produktresumén för Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

	För fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn som väger upp till 10 kg	För småbarn och barn som väger mer än 10 kg och upp till 33 kg	För barn, ungdomar och vuxna som väger mer än 33 kg och upp till 50 kg	För barn, ungdomar och vuxna som väger mer än 50 kg utan ytterligare riskfaktorer för hepatotoxicitet	För barn, ungdomar och vuxna som väger mer än 50 kg med ytterligare riskfaktorer för hepatotoxicitet (se produktresumén)
Dos per administreringstillfälle	7,5 mg/kg	15 mg/kg	15 mg/kg	1000 mg	1000 mg
Volym per administreringstillfälle	0,75 ml/kg	1,5 ml/kg	1,5 ml/kg	100 ml	100 ml
Maximal dygnsdos	30 mg/kg (motsvarande 3 ml/kg)	60 mg/kg (motsvarande 6 ml/kg)	60 mg/kg (motsvarande 6 ml/kg)	4000 mg (motsvarande 400 ml)	3000 mg (motsvarande 300 ml)
Behållare för dosering *	10 ml behållare (om inte tillgänglig: 50 ml behållare)	50 ml behållare	100 ml behållare		

* Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Lösningen ges som en **intravenös infusion under 15 minuter**. **Intervallet mellan administreringstillfällen måste vara minst 4 timmar**. **Högst 4 doser får ges under 24 timmar**.

Hos patienter med **allvarlig njurinsufficiens**, ta hänsyn till informationen i produktresumén.

Den angivna **maximala dygnsdosen är endast avsedd för patienter som inte får andra produkter innehållande paracetamol**.

Mer information om uppdragning, spädning och infusion finns i produktresumén och bipacksedeln.

Dosering av Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Särskilda instruktioner för fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn som väger upp till 10 kg

1 ml infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg paracetamol.

Dosen per administreringstillfälle är 7,5 mg/kg som motsvarar 0,75 ml/kg kroppsvikt. Volymen som krävs kan vara mycket liten. Se exempel i tabellen. Volymen per administreringstillfälle ska aldrig överstiga 7,5 ml. Den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg (motsvarande 3 ml/kg).

Originalbehållaren ska inte användas som sådan för infusion.

Volymen som ska administreras ska tas från behållaren och spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %) upp till 1:10 (1 del Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning till 9 delar spädningsvätska). En 5 ml eller 10 ml spruta ska användas för att mäta upp dosen som ska administreras. En sprutpump kan även användas.

Högst 4 doser får ges under 24 timmar

Patientens vikt	Dos per administreringstillfälle	Volym per administreringstillfälle
3 kg	22 mg	2,2 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml
5 kg	37 mg	3,7 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml
7 kg	52 mg	5,2 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml
9 kg	67 mg	6,7 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml

Alla utbildningsmaterial för Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning och information till hälso- och sjukvårdspersonal finns även tillgängliga på FASS samt på B. Braun Medical AB:s hemsida.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:

B. Braun Medical AB

E-post info.sverige@bbraun.com

Telefon 08 - 634 34 00