

Till dig som fått Ejulir® förskrivet

Ejulir®
liraglutid injektion

Du har fått Ejulir® (liraglutid) 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, förskrivet av din läkare som komplement för behandling av obesitas (fetma). Här finns lite information som du kan ha nytta av: Dosering, frågor & svar och en viktdagbok.

Behandling med Ejulir® används som ett komplement i kombination med hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet för att gå ner i vikt och hålla den under kontroll.

Läkemedlet verkar via signaler mellan tarmen och hjärnan och får aptiten att minska.

Läkemedlet kan ge vissa biverkningar. De vanligaste är illamående, diarré, förstoppning, huvudvärk och trötthet.



Skanna QR-koden för att se demonstrationsvideo med användarinstruktioner



Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Den innehåller fullständig information och användarinstruktioner. Detta dokument innehåller vanliga frågor och svar om Ejulir (liraglutid). Informationen bygger på innehållet i bipacksedeln. Ejulir används för viktkontroll i kombination med anpassad kost och motion. Du får läkemedlet på ordination av läkare och ska alltid följa de anvisningar du fått av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Frågor & svar om Ejulir

1. Vad är Ejulir?

Ejulir är ett läkemedel för viktkontroll

som innehåller den aktiva substansen liraglutid. Den liknar ett naturligt förekommande hormon som kallas glukagonlik peptid-1 (GLP-1) som frigörs från tarmen efter en måltid. Ejulir fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit. Det leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Behandlingen ska användas tillsammans med kost och fysisk aktivitet. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.

2. Hur och när tar jag min dos – och var ska jag injicera?



Ejulir kan tas när som helst på dygnet, med eller utan mat. Ta det vid ungefär samma tid varje dag. Injicera under huden (subkutant) på framsidan av buken, framsidan av låren eller i överarmen och växla injektionsställe dagligen. En video med steg-för-steg intruktioner hur du tar Ejulir finns tillgänglig på **www.medicininstruktioner.se**.

3. Vad gör jag om jag glömmer en dos – eller har tagit för mycket?



Missad dos: Om du kommer på det inom 12 timmar, ta dosen så snart du minns. Har det gått mer än 12 timmar, hoppa över dosen och ta nästa dos på ordinarie tid nästa dag. Ta inte dubbel/högre dos för att kompensera.

För stor mängd: Kontakta läkare eller sjukhus omedelbart och ta med läkemedelsförpackningen. Illamående, kräkningar och lågt blodsocker kan förekomma.

4. Är det normalt att känna illamående i början?



Ja. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och huvudvärk är mycket vanliga i början och brukar avta efter några dagar eller veckor.

5. Vad gör jag om jag upplever stark magsmärta?

Stark och ihållande magsmärta som strålar mot ryggen, ofta med illamående/ kräkningar, kan vara tecken på Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller inflammation i gallblåsan. **Sluta ta Ejulir och kontakta läkare omedelbart.** Dessa tillstånd är mindre vanliga biverkningar vid behandling med Ejulir, men det är viktigt att vara uppmärksam på sådana symtom.



6. Är det vanligt med reaktioner på injektionsstället?

Ja. Blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag vid injektionsstället är vanliga. Växla injektionsställe varje dag för att minska risken för knutor.



7. Hur ska jag förvara min penna när den används?



Efter påbörjad användning kan pennan förvaras i upp till 1 månad vid ≤ 30 °C eller i kylskåp (2–8 °C). Får ej frysas och ska förvaras med pennhuv på.

8. Hur vet jag om min injektionsnål är tilltäppt?

Om dosräknaren inte går tillbaka till 0 trots att du håller dosknappen intryckt kan nålen vara tilltäppt/skadad. Då har du inte fått någon dos. Byt nålen och upprepa enligt anvisningarna.

Vid helt ny spruta, ska man testa att det kommer en droppe, dvs att flödet funkar.

9. Kan Ejulir påverka min puls?



Ja, snabbare puls kan förekomma (mindre vanligt). Kontakta läkare vid hjärtklappning eller om hjärtat känns som det rusar i vila.

10. Kan jag fortsätta använda Ejulir om jag ska opereras?

Informera din läkare inför planerad operation med narkos.

11. Får Ejulir användas tillsammans med andra läkemedel?



Berätta ALLTID vilka läkemedel du tar. Var särskilt uppmärksam på diabetesläkemedel som sulfonureider och insulin (risk för lågt blodsocker) samt warfarin (kan kräva tätare kontroller av blodets levringsförmåga). Ejulir ska inte blandas med andra injektionsläkemedel och ska inte användas med andra GLP 1 receptoragonister.

12. Får jag dela min penna med någon annan?



Nej. Dela inte penna eller injektionsnålar med andra. Det minskar risken för kontaminering, infektion och skador.

13. Varför är det viktigt att få i sig tillräckligt mycket vätska när man behandlas med Ejulir?



När du börjar behandlingen med Ejulir kan du förlora kroppsvätska och bli uttorkad. Detta kan hända om du blir illamående, kräks eller får diarré. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka tillräckligt mycket vätska.

14. Vilka biverkningar kan förekomma – och när ska jag söka vård?



Mycket vanliga: illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, huvudvärk (brukar avta efter några dagar/veckor).

Vanliga: mag-tarmbesvär (t.ex. dyspepsi, gastrit, halsbränna, gaser), trötthet/svaghetskänsla, förändrad smak, yrsel, sömnsvårigheter (oftast under första 3 månaderna), gallsten, hudutslag, reaktioner vid injektionsstället, lågt blodsocker.

Mindre vanliga/sällsynta: uttorkning, fördröjd mag-säckstömning, inflammerad gallblåsa, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), allergiska reaktioner, snabbare puls, nedsatt njurfunktion/akut njursvikt.

Sök vård omedelbart: Vid svår och ihållande buksmärta som kan stråla mot ryggen med illamående/kräkningar eller tecken på allvarlig allergisk reaktion (andningssvårigheter, svullnad i ansikte/hals, hjärtklappning).

Allvarliga biverkningar

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi): Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad av ansikte och svalg och hjärtklappning.

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) är ett allvarligt och möjligt livshotande sjukdomstillstånd. Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar: Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut mot ryggen samt illamående och kräkningar, eftersom det kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Din läkare bestämmer om hur mycket Ejulir® du ska ta varje vecka. Du kommer förmodligen att följa nedanstående tabell.

Dosupptrappningsschema

Vecka	Injicerad dos
Vecka 1	0,6 mg en gång dagligen
Vecka 2	1,2 mg en gång dagligen
Vecka 3	1,8 mg en gång dagligen
Vecka 4	2,4 mg en gång dagligen
Vecka 5 och framåt	3,0 mg en gång dagligen



När du har nått den rekommenderade dosen på 3,0 mg i vecka 5 av behandlingen ska du fortsätta med denna dos tills behandlingsperioden är slut. Öka inte din dos ytterligare. Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling.

Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Den innehåller fullständig information och användarinstruktioner. Detta dokument innehåller vanliga frågor och svar om Ejulir (liraglutid). Informationen bygger på innehållet i bipacksedeln. Ejulir används för viktkontroll i kombination med anpassad kost och motion. Du får läkemedlet på ordination av läkare och ska alltid följa de anvisningar du fått av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

