

Remsima™ (Infliximab)

Patientkort

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remsima.

Namn, patient:

Namn, läkare:

Telefonnummer, läkare:

När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Remsima.

Läs noga Remsima bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.

Datum för påbörjad behandling med Remsima:

Senaste behandlingar:

Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsatsnumret på ditt läkemedel.

Produktnamn:

Tillverkningsatsnummer:

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning.

Undersökning:

Datum:

Resultat:

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Lista över allergier:

Lista över andra läkemedel:

Infektioner

Före behandling med Remsima

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus.

Under behandling med Remsima

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

Graviditet, amning och vaccinationer

- Om du har fått Remsima under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få "levande vacciner", såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.

Hereditär fruktosintolerans

- Remsima 100 mg och 350 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller sorbitol. Om du har hereditär fruktosintolerans (HFI) får du inte ges den intravenöst administrerade beredningen.
- Tala om för din läkare om du har hereditär fruktosintolerans. I så fall finns andra lämpliga intravenösa formuleringar av infliximab tillgängliga.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Remsima-dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

EMA/368402/2025 - PI version 50.0