Elvanse®
lisdexamfetamin

Lättläst

Information om **Elvanse®** (lisdexamfetamin)

Den här texten är till dig som är förälder eller anhörig till ett barn som fått Elvanse utskrivet.

Narkotikaklass: II - Narkotika med medicinsk användning.

Takeda

Viktigt att veta om Elvanse

- Elvanse används för att behandla ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet).
- Elvanse är ett läkemedel som kan ge beroende. Därför är det viktigt att ta det enligt läkarens instruktioner.

!



Vad är ADHD?

ADHD påverkar hjärnan och gör det svårare att:

- **hålla fokus.**
- **hantera impulser.**
- **vara lagom aktiv.**

ADHD är relativt vanligt. Ungefär fem procent av barn i skolåldern är drabbade.

Symtom på ADHD kan vara:

Svårt att koncentrera sig och att komma ihåg instruktioner.

Till exempel: Tappa bort saker, ha svårt att komma igång och behålla fokus.

Svårt att kontrollera impulser och att styra sina känslor.

Till exempel: vara lättidistraherad, hamna i bråk och lätt bli arg.

Överaktivitet och alltid behöva röra på sig.

Till exempel: ha svårt att sitta still och ha många tankar i huvudet.

Om barnet inte är överaktivt kallas det ibland ADD.

Hur hjälper Elvanse?

Elvanse kan göra att ditt barn kan koncentrera sig bättre.

Elvanse kan göra det enklare att delta i aktiviteter med andra.

Elvanse kan minska impulsivitet och göra ditt barn mindre rastlöst.

Det här är målet med behandlingen:

- Att ditt barn ska fungera bättre i skolan, hemma och i andra situationer.
- Att barnet ska kunna lära sig saker bättre.

Hur ska ditt barn ta Elvanse?

Elvanse ska tas enligt läkarens instruktioner.
Om du är osäker, prata med läkaren eller apoteket.

Det finns 3 sätt att ta Elvanse:

1 Svälj kapseln hel med vätska.

2 Öppna kapseln och lös upp innehållet i vatten eller juice.

3 Öppna kapseln och blanda innehållet i yoghurt eller annan mjuk mat.

Ta medicinen på morgonen, med eller utan mat.

Viktigt att tänka på:

- Blandningen ska ätas eller drickas direkt.
- Ta hela kapseln på en gång.
- Glömmer barnet en dos? Ta nästa dos som vanligt nästa dag. Ta aldrig dubbel dos!

Om du märker oväntade förändringar eller biverkningar:

- Kontakta läkaren direkt.
- Läkaren följer ditt barns längd, vikt och matvanor under behandlingen.

Vanliga biverkningar

Elvanse kan ge biverkningar, men inte alla får dem.

Vanliga biverkningar är:

sämre aptit

torr i munnen

viktminskning

huvudvärk

sömnbesvär

magont

Förvara Elvanse säkert. Elvanse är bara till ditt barn och läkemedlet kan skada andra.

Sluta inte med Elvanse utan att prata med läkaren.

Viktigt!



Läs alltid bipacksedeln för att
få mer detaljerad information.

På **adhdivardagen.se** finns verktyg som checklistor och scheman som kan underlätta vardagen.



Har du frågor? Skriv ner dem och ta med dem till läkaren eller sjuksköterskan.

Elvanse®
lisdexamfetamin

För mer information om ADHD besök gärna: attention-riks.se – Riksförbundet Attention, intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD.

❖ **Narkotikaklass: II - Narkotika med medicinsk användning**

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) 20/30/40/50/60/70 mg hårda kapslar.

Vad Elvanse är och vad det används för: Elvanse har en positiv effekt på hjärnaktiviteten och bidrar till att förbättra uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende. Elvanse används som en del av ett omfattande behandlingsprogram för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet) hos barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som tidigare har behandlats med läkemedlet metylfenidat utan tillräcklig effekt på ADHD, och hos vuxna som har haft ADHD-symtom sedan barndomen. Om du inte har behandlats för ADHD tidigare kommer läkaren att kontrollera om du har haft ADHD sedan barndomen innan Elvanse förskrivs. Om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en månads behandling måste du tala med läkare.

Ta/Använd inte Elvanse: Om du är allergisk mot lisdexamfetamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, om du för närvarande tar så kallade monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna, om du har problem med sköldkörteln, känner dig ovanligt upprymd, överaktiv eller ohämmad, har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta eller obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtproblem, om du har högt eller mycket högt blodtryck eller förträngningar i blodkärlen, eller om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom).

Varningar och försiktighet: Tala med läkare innan du använder Elvanse om du någonsin har missbrukat alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger, har haft njurproblem, kramper (krampanfall, konvulsioner, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG), har svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepar ljud och ord, har högt blodtryck, tidigare har haft oregelbunden hjärtrytm eller om oregelbunden hjärtrytm finns i släkten (kan ses på EKG), eller om du har en sjukdom och/eller får en behandling som gör att du kan få oregelbundna hjärtslag eller saltobalans, har ett hjärtproblem som inte nämns i ovanstående avsnitt ”Ta inte Elvanse”, tidigare har haft en stroke, eller om du har ett psykiskt problem. Om Elvanse inte används korrekt kan det orsaka avvikande beteende och användaren kan bli beroende av läkemedlet. Ge inte detta läkemedel till någon annan, även om de uppvisar liknande sjukdomstecken. Elvanse kan orsaka störningar i hjärtrytmen hos vissa patienter. Om du får hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingens gång ska du omedelbart informera din läkare. Elvanse bör inte användas under graviditet om inte läkaren uttryckligen ordinerat detta, och bör inte användas under amning. Kan ha en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner då Elvanse kan orsaka yrsel, dåsighet och synstörningar.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda Elvanse.

Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2025-01-07.

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com.

circusreklam.se

C-APROM/SE/ELVS/0185

Takeda