Swedish

accord

PATIENTKORT

Apixaban Accord (apixaban)
Patientkort

Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdpersonal innan behandling.

Jag behandlas med Apixaban Accord (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be läkaren fylla i

Namn:
Födelsedatum:
Indikation:
Vikt:
Dos: mg två gånger dagligen
Läkarens namn:
Läkarens telefonnummer:

Information till patienten/vårdnadshavare

- Ta/ge Apixaban Accord regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas/ges tillsammans med kvällsdosen. En missad kvällsdos kan bara tas/ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa doseringsschemat två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.

Swedish

- Sluta inte ta/ge Apixaban Accord utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke /blodpropp eller andra komplikationer.
- Apixaban Accord hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart**.
- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder Apixaban Accord.

07/2026

Information till vårdpersonal

- Apixaban Accord (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Accord kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Accord kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatriska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).